

PREDNISOLONA

Glucocorticoide.



FÓRMULA

Prednisolona base 20 mg

Excipientes c. s. p.: 500mg

DESCRIPCIÓN

Glucocorticoide

INDICACIONES

Procesos inflamatorios y alérgicos (prurito) en donde esté indicado el uso de glucocorticoides. Enfermedades autoinmunes. Útil como coadyuvante en la terapéutica antineoplásica. Terapia de sustitución.

DOSIFICACIÓN

Perros y gatos: Terapia de sustitución: 0,25 mg/Kg/día. En estados de estrés, aumentar la dosis 2 a 5 veces. Enfermedades autoinmunes y como coadyuvante de la terapéutica antineoplásica: 2 a 4 mg/Kg/día. En procesos inflamatorios: 0,5 a 1 mg/Kg/día. Para un tratamiento prolongado se debe realizar la terapia a días alternos. Este esquema evita la supresión del eje Hipotálamo-hipófiso-adrenal permitiendo la recuperación del mismo en los días que no se administra la prednisolona. Esquema terapéutico: 1) Dosis de inducción: 0,5 a 1 mg/kg/12 horas. durante 5 a 7 días. 2) Continuar con 1 a 2 mg/kg una toma cada 48 horas. durante 7 días. 3) La semana siguiente continuar con el mismo régimen de administración (cada 48 horas), y con una dosis 50% menor. 4) Reducir semanalmente la cantidad de prednisolona (administrando siempre a días alternos) hasta llegar a la dosis mínima de mantenimiento con efecto terapéutico. 5) No interrumpir en forma súbita la administración sino gradualmente. Se sugiere que la administración de prednisolona se realice respetando el ciclo circadiano de cada especie: Perros: diurno / Gatos: nocturno.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Contraindicaciones: enfermedades infecciosas bacterianas, virales y micóticas - Demodex - Úlceras gastrointestinales - Colitis ulcerativa - Pancreatitis - Insuficiencia renal - Amiloidosis - Diabetes mellitus - Osteoporosis - Artritis crónica erosiva - Gestación - Glaucoma.

Precauciones: en piodermias con intenso prurito utilizar la antibioticoterapia adecuada conjuntamente con Prednisolona teniendo en cuenta que se debe interrumpir la administración de prednisolona antes que el antibiótico para evitar recidivas.

