Droguería e Importadora Alemana

Richmond Vet Pharma™

CATÁLOGO AGRO 2022

Droguería e Importadora Alemana (DIASA), es una empresa latinoamericana, fundada en Panamá en 2014, dedicada a la promoción y venta de medicamentos especializados y suplementos nutricionales especializados para la Salud Humana. Productos farmacéuticos, dietas especiales y alimento de uso en Medicina Veterinaria para Mascotas. Medicamentos y suplementos alimenticios de alta tecnología para Grandes Especies (Bovinos, Porcinos, Caprinos, Ovinos, Equinos, Avícolas), y una línea de agricultura especializada en Agro, Acuicultura y Apicultura.

Nuestras bodegas debidamente habilitadas, una para medicamentos de uso humano (habilitación F&D) y otras para medicamentos de uso veterinario, avicultura y agro (habilitación MIDA).

Su nombre surge en relación con el origen de uno de los socios fundadores y enmarca en el mismo, el deseo de llevar al mercado productos de alta calidad certificada.

Somos una organización ágil, dinámica. Nuestro equipo tiene vasta experiencia en varios mercados de Latinoamérica, en áreas como mercadeo, ventas a gobierno, alta gerencia, asuntos regulatorios, control de calidad, visita médica (coaching), veterinaria, agronomía, agricultura y distribución tanto de productos farmacéuticos para Salud Humana, como productos farmacéuticos y suplementos alimenticios para la Medicina Veterinaria y la Agricultura.

En la DIVISIÓN AGRO: Nos esforzamos por llevar un trabajo técnico de calidad para dar un aporte a nuestros productores y de esta forma, con nuestros aliados comerciales: Agro servicios, Técnicos y Médicos Veterinarios, lograr mejorar la productividad en los diferentes rubros en los que participamos.

INDICE

Bovinos 1

Porcinos 8

Equinos 13

Anestésicos 19

Agro 27

Abejas 28

Átomos 29

Contáctenos **+507 203-8740**

Edificio De Lesseps, piso 5, oficina 1, Área Bancaria, Panamá

Email: **ventas@drogueriaalemana.com**

WWW.DROGUERIAALEMANA.COM

NUTRIMIN

Uso: Bovinos, Porcinos y Ovinos.

Acción: Suplemento nutricional inyectable.

Indicaciones: Indicado para mejorar el aspecto general de los animales, el desarrollo de la masa muscular y ósea, aumento de parámetros productivos como el crecimiento, ganancia de peso diaria y producción láctea, el estado del pelo (descolorido, sin brillo, reseco, frágil). Colabora en la recuperación del estado de animales subnutridos o convalecientes por enfermedades infecciosas o parasitarias.

Para animales expuestos a condiciones desfavorables (estrés climático, hacinamiento, transporte, vacunación, castraciones), que provoquen en el organismo una disminución de las reservas corporales de vitaminas, minerales y metionina.

Trastornos en la reproducción (celos silentes, anestro nutricional), asociadas a carencias de Fósforo, Cobre, Zinc y Selenio. Patologías en pezuñas, queratoconjuntivitis, ceguera nocturna y enfermedad del músculo blanco.

Composición: Cloruro de calcio 0,014 g., Vitamina A 0,150 g., Vitamina E 0,750 g., Edetato de Cobre y Zinc 22,500 mL., Selenito de Sodio 0,006 g., D-L Metionina 1,500 g., Fosfato Diácido de Potasio 0,200 g., Excipientes c.s.p. 100,000 mL.

Administración: Subcutánea.

Dosis: Novillos y vaquillonas: 5 ml., **Vacas y toros:** 10 ml., **Ovinos, porcinos y terneros:** 3 ml., **Corderos y capones:** 2ml.

Se sugiere utilizar cada 60 días.

Presentación: Viales de 100 ml, 250 ml y 530 ml.

PROSEL

Uso: Bovinos, Pequeños rumiantes.

Acción: Suplemento vitamínico y mineral que cubre deficiencias primarias y secundarias en ganado lechero, carne y reproducción

Indicaciones: Anestro nutricional, infertilidad, retención placentaria, aumento de la inmunidad general, enfermedad del músculo blanco. Indicado en vacas de lechería y parto de hato, terneros al pie de la madre o al destete. Promueve la disminución de células somáticas en leche.

Composición: Selenio, Vitamina E, Vitamina A y Fósforo.

Administración: Subcutánea.

Dosis: 1 a 2 mL/50 Kg. No aplicar más de 10 ml por punto de aplicación. **Suplementación continua:** Cada 60-90 días. **Preparto: En vacas lecheras:** Una dosis al momento del secado, repitiendo la misma entre 10 a 7 días previo a la fecha probable del parto. Una tercera dosis se podrá repetir 30 días después de esta última. **En vacas de cría:** En un período comprendido entre 30 a 45 días antes de la fecha probable de parto del rodeo. **Pre-servicio:** Previo a comenzar los servicios programados en machos y hembras. Destete convencional, precoz o anticipado. Se indicará desde terneros al pie de la madre hasta el momento del destete inclusive y en programas IATF.

Presentación: Viales por 100, 250 y 500 mL.

ACUPRIN

Uso: Bovinos, Porcinos y Pequeños rumiantes.

Acción: Gel de Liberación gradual que corrige desbalances dependientes de Zinc y cobre. Previene y revierte enfermedades fisiopatológicas y desbalances metabólicos.

Indicaciones: Carencias de Cobre y/o Zinc de tipo primaria y/o secundaria. Anestro nutricional, síndrome de infertilidad carencial, abortos, retenciones placentarias por mala nutrición, absorción embrionaria, mastitis subclínica, ovarios quísticos y poliquísticos, repetición de celos, muerte perinatal, metritis, acromotriquia (decoloración del pelo), alteraciones de la osificación, desarrollo deficiente. Previene y revierte la queratoconjuntivitis insidiosa y el pietín. ACUPRIN Zinc / Cobre / DL-Metionina.

Composición: Edetato de cobre y zinc 40.30 gr-DL Metionina.

Administración: Subcutánea 1.10 g; excipientes CSP 100 ML.

Dosis: Menos de 200 Kg, 2 mL totales. Más de 200 Kg, 3 mL totales. **Novillas, toros y vacas:** 4 mL. totales. Se sugiere no administrar el producto dentro de los 30 días posteriores a la última vacunación de los animales con cualquier tipo y origen de vacuna. No aplicar más de 5 ml totales por punto de aplicación. Se indica a hembras entre 6 y 7 meses de gestación, se indica a hembras de 45 a 60 días post-parto, se indica en terneros de 2 a 3 meses de edad, el tratamiento puede ser de 30 a 60 días. **Ovinos:** Se podrá administrar entre 4 a 6 semanas previas a la fecha estimada del parto.

Presentación: Viales por 100 y 500 mL. Gel de absorción gradual.

FLEANET POUR ON

Uso: Bovinos y Porcinos.

Acción: Antiparasitario de uso externo mosquicida y repelente. Uso Pour On.

Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de la Mosca de los cuernos (Haematobia irritans, Horn fly) en bovinos. Puede utilizarse para el tratamiento y la prevención de infestaciones por piojos en bovinos y porcinos.

Composición: Cipermetrina 5 g., Fenitrotión 4 g., Butóxido de Piperonilo 1 g., Exipientes c.s.p 100 ml.

Administración: Aplicación por derrame cutáneo (sistema Pour On).

Dosis: Bovinos: Hasta 400 kg: 10 ml totales.Más de 400 kg: 20 ml totales.

PERIODO DE RETIRO: Periodo prefaena 7 dias. No deja residuos en leche. Apto para vacas en ordeñe.

Presentación: Bidones autodosificadores por 1 litro . Solución oleosa de uso externo.

FLEANET AG PLATA

Uso: Caballos, Bovinos, Ovinos, Caprinos, Cerdos y Caninos.

Acción: Curabicheras en aerosol – Antimiásico – Antiséptico – Repelente – Cicatrizante.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de la miasis, en heridas en general, descole, castraciones, descorne, ombligo del recién nacido. En operaciones quirúrgicas, protegiendo la herida de una posible infección. Posee gran poder de volteo, penetración y adherencia.

Composición: Fenitrotión: 0,538 g; Cipermetrina al 92% 0,423 g; Polvo de aluminio: 1,538 g; Sulfadiazina de plata: 0,038 g; Agentes de Formulación y gases Propano/Butano c.s.p. 100 g.

Administración: Uso externo. Rociar la zona afectada sosteniendo el aerosol a 15/20 cm del área a tratar.

Dosis: Aplicar una o dos veces por día durante cuatro o cinco días.

Presentación: Aerosol de 440 mL/16 Oz. Válvula de doble acción con sistema autolimpiante. Pulsador y actuador plano de aspersión controlada.

Periodo de retiro: 7 días entre el último tratamiento y el sacrificio. 72 horas en leche después del último tratamiento.

PROFIT

Uso: Animales de las especies bovinas, porcinas y equinos y pequeños rumiantes en la última etapa de engorde, desarrollo y crecimiento.

Acción: Solución inyectable oleosa que actúa como promotor de crecimiento, desarrollo y engorde para animales productores de carne.

Indicaciones: Incrementan la ganancia de peso diaria, aumentan la conversión alimenticia de proteína a musculo, promueven la captación y retención de nitrógeno, vitaminas y minerales dietarios.

Composición: Testosterona Propionato 5,20 g., Vitamina A (Palmitato) 1 g., Vitamina E (Acetato) 1 g., Excipientes c.s.p. 100 ml.

Administración: Vía subcutánea exclusivamente.

Dosis: Se sugiere 1 ml cada 50 kg de peso.

Dosis máxima recomendada: 10 ml totales.

Intervalo entre dosis: La dosis sugerida podrá ser repetida, en ciclos de engorde continuo, cada 60 a 90 días.

Presentación: Vial de 250 ml y 100 ml.

Período de retiro: 30 días para sacrificar desde la última aplicación.

BAGOPELL

Uso : Bovinos y Ovinos.

Acción: Anabólico no hormonal para bovinos y ovinos, para aumentar promedio de ganancia diaria de peso de la carne y mejorar la conversión alimenticia.

Indicaciones: Diseñado para incrementar la ganancia diaria de peso, aumentar la talla de los animales, mejorar la conversión alimenticia y calidad de carne en bovinos y ovinos destinados a la engorda en corral y/o pastoreo en periodos de inicio y desarrollo. Bago-Pell® puede ser empleado en animales desde el primer día de nacidos re-implantando cada 90 días hasta el destete logrando animales con mayor peso en ese momento o alcanzar el peso deseado en menos tiempo.

Composición: Cada comprimido contiene: Zeranol 12 mg., Excipientes, c.b.p. 40 mg.

Administración: Subcutánea en la cara posterior de la oreja, en el tercio medio. El zeranol no presenta tiempo de retiro para el consumo de la carne de animales implantados.

Dosis: Bago-Pell® se administra en **Bovino**s a razón de un implante de 3 comprimidos (36 mg) por animal cada 3 meses (90 días).

Ovinos: Un implante de 1 comprimido (12 mg) por animal cada 3 meses (90 días).

Presentación: Una rueda de 24 dosis (72 implantes).

BATOXIL L.A.

Uso: Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Aves de Corral.

Acción: Antimicrobiano, Antibiótico Tetraciclina

Indicaciones: Es un antibiótico de efectiva acción contra un amplio espectro de bacterias Gram positivas y Gram negativas. Micoplasmas, Clamideas, Rickettsias y algunos hongos y protozoos patógenos.

Composición: Oxitetraciclina Base 20,00 g; Excipientes c.s.p. 100 mL.

Administración: Inyectable. Vía IM.

Dosis: Bovinos, Ovinos, Porcinos y Caninos: 1 mL cada 10 kg de peso (20 mg/kg). **Aves:** 0,25 mL por kilo de peso por vía subcutánea (50 mg/kg)

Interacciones con otras drogas: No combinar con agentes bactericidas como son los derivados de las penicilinas.

Presentación: Viales por 100, 250 y 500 mL. Solución inyectable estéril.

Período de retiro: 28 días antes del sacrificio deben pasar desde la última aplicación.

VITONAL B

Uso: Bovinos

Acción: Tratamiento de urgencia del Síndrome de vaca caída. Fiebre puerperal.

Indicaciones: Está indicado en todas aquellas circunstancias en las cuales un bovino caiga en decúbito involuntariamente y no pueda recuperar la estación por sus propios medios (descartando las patologías traumáticas).

Se sugiere especialmente su uso en la terapéutica de urgencia en el síndrome de vaca caída cubriendo de manera eficiente los requerimientos en los casos de hipocalcemia aguda post parto, tetania hipomagnesémica aguda, hipofosfatemia aguda, hipocalemia, cetoacidosis, síndrome hipoenergético, neuritis del plexo lumbosacro, miositis, rabdomiolisis, hiponutrición, agotamiento, caquexia y estados generales de desbalance metabólico.

Composición: Calcio, borogluconato 8,26 g., Calcio, lactobionato 6,89 g., Calcio, levulinato 5,63 g., Calcio, hipofosfito 0,22 g., Magnesio, lactobionato 25,69 g., Magnesio, hipofosfito 0,86 g., Vitamina B1 0,53 g., Potasio, cloruro 0,022 g., Cafeína anhídrica 0,058 g., Agentes de formulación c.s.p. 100 ml.

Administración: Inyectable, intravenosa y subcutáneo.

Tratamiento de sostén: inmediatamente luego de que el animal recupera la estación, administrar 15 a 20 ml cada 100 kg de peso repartidos en 4 puntos de aplicación.A las 24 hs de recuperado administrar en animales de hasta 250 kg de peso 20 ml totales, más de 250 kg de peso 40 ml totales. Por vía subcutánea.

Presentación: Viales por 530 mL.

BOVINOS

VIUSID VET

Uso: Equinos, Bovinos, Porcinos, Aves (Pollos de engorde, Gallinas Ponedoras y Reproductoras, Pavos, Ovejas y Conejos de cualquier edad).

Acción: VIUSID VET actúa sobre el crecimiento de los animales reforzando su sistema inmunológico, aumenta el apetito y es un excelente antioxidante, antiviral y hepatoprotector.

Indicaciones: Está recomendado para satisfacer los requerimientos en vitaminas y oligoelementos de los animales de granja durante periodos de estrés y enfermedad, o durante cambios de alimentación, fases críticas de crecimiento y preparación para la reproducción. **VIUSID VET** actúa sobre el crecimiento de los animales reforzando su sistema inmunológico, aumenta el apetito y es un excelente antioxidante, antiviral y hepatoprotector, ideal también para procesos que causan inmunodeficiencia, la activación de los ingredientes de VIUSID incrementa en gran medida el poder de las funciones biológicas de ellos, garantizando un aumento significativo en la producción.

Composición: Acido Málico, Glucosamina, Arginina, Glicina, Acido Ascórbico, Glicirricinato Monoamónico, Clorhidrato de Piridoxina, Sulfato de Zinc, Pantotenato Cálcico, Ácido Fólico, Cianocobalamina, Benzoato Sódico, Sorbato Potásico, Maltodextrina, Carbonato Cálcico, Dióxido de Silicio.

Administración: Diluido en agua o en alimento.

Dosis: Polvo: Mezclar Viusid Vet polvo con el concentrado 1 Kg de Viusid Vet polvo por cada 1,000 kg de concentrado (22 quintales) durante todo el ciclo de producción.

Líquido: Mezclar Viusid Vet liquido 1 litro por cada 1,000 litros de agua de bebida durante todo el ciclo de producción.

Presentación: Polvo: 1 Kilo, **Liquido:** 150 ml., 1 litro

HEPATONE

Uso: Equinos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.

Acción: Protector y estimulante de la función hepática.

Indicaciones: Protege y estimula la actividad hepática. Disfunciones hepáticas como hepatitis, insuficiencia hepática, intoxicaciones por plomo, mercurio, arsénico. Intoxicaciones alimentarias. Cetosis.

Composición: Sorbitol: 21 g; D-L Metionina: 1,5 g; Tiamina HCl: 0,30 g; Ácido Tióctico: 0,20 g; Excipientes c.s.p. 100 mL.

Administración: Inyectable por vía intramuscular.

Dosis: Caballos y Bovinos: 50 a 100 mL totales. **Porcinos:** 10 a 20 mL. **Ovinos:** 5 a 10 mL. **Caninos y Felinos:** 1 mL cada 10 kg de peso.

Presentación: Vial por 50 ml, 100 mL, 250 ml.

DEXA 20

Uso: Caballos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.
Acción: Antiinflamatorio glucocorticoide de alta concentración y efecto rápido.
Indicaciones: Potente antiinflamatorio corticosteroide de máxima concentración y acción ultra rápida. Indicado en estados de shock, broncoespasmo, traumatismos craneoencefálicos, compresión medular, raquialgia, neuralgias y neuropatías, artropatías, enfermedades autoinmunes y síndrome anoréxico.
Composición: Dexametasona 21 Fosfato disódico a la máxima concentración de 2 g., Excipiente c.s.p. 100 mL.
Administración: Inyectable por todas la vías.
Dosis: Caballos, Bovinos, Ovinos y Porcinos: 0,05 a 0,2 mg/Kg;
Caninos y Felinos: 0,1 a 2 mg/Kg.
Dosis de shock: 4 a 8 mg/Kg en todas las especies.
Presentación: Viales por 20 mL.

ESTREPTOPENDIBEN

Uso: Equinos, Bovinos y Porcinos.
Acción: Antibiótico inyectable de amplio espectro de acción antibacteriana y su efecto es bactericida. Simultáneamente controla la hipertemia del síndrome febril, el dolor y la congestión característica de los procesos sépticos. La vitamina C que contiene ayuda a mejorar las condiciones fisiológicas para combatir el estrés.
Indicaciones: Neumonías, bronconeumonías, neumoenteritis, nefritis, pielonefritis, cistitis, metritis, hepatitis, mastitis, septicemias, adenitis equina, abscesos interdigitales, actinomicosis, carbunco bacteriano, tétanos, leptospirosis. En todos los casos de infecciones provocadas por gérmenes sensibles a la penicilina o estreptomicina en bovinos y equinos.
Composición: cada frasco con polvo contiene penicilina sódica, 2,000,000 UI; Penicilina Benzatínica, 2,500,00 UI; estreptomicina (como sulfato), 2,000 mg; dipirona, 1,000 mg. Cada ampolla con solvente contiene: Vitic, 1100 mg; Clorhidrato de Lidocaina, 60 mg; excipientes c.s.p. 16 ml.
Administración: Vía inyectable intramuscular profunda.
Dosis: Bovinos y equinos: 3.2 mL cada 100 kg. Por lo general una sola inyección es suficiente. Si persistieran los síntomas puede ser repetida la aplicación a las 24-48 horas.
PERIODO DE RETIRO No sacrificar animales para consumo humano hasta haber transcurrido 30 días del último tratamiento. No destinar para consumo humano o industrialización, la leche proveniente de animales tratados hasta haber transcurrido 8 ordeñes (4 días) desde el último tratamiento.
Presentación: Contiene 1 frasco con polvo y 1 ampolla con solvente (16 ml) .

NUTRIMIN

Uso: Bovinos, Porcinos y Ovinos.
Acción: Suplemento nutricional inyectable.
Indicaciones: Indicado para mejorar el aspecto general de los animales, el desarrollo de la masa muscular y ósea, aumento de parámetros productivos como el crecimiento, ganancia de peso diaria y producción láctea, el estado del pelo (descolorido, sin brillo, reseco, frágil). Colabora en la recuperación del estado de animales subnutridos o convalecientes por enfermedades infecciosas o parasitarias.
Para animales expuestos a condiciones desfavorables (estrés climático, hacinamiento, transporte, vacunación, castraciones), que provoquen en el organismo una disminución de las reservas corporales de vitaminas, minerales y metionina.
Trastornos en la reproducción (celos silentes, anestro nutricional), asociadas a carencias de Fósforo, Cobre, Zinc y Selenio. Patologías en pezuñas, queratoconjuntivitis, ceguera nocturna y enfermedad del músculo blanco.
Composición: Cloruro de calcio 0,014 g., Vitamina A 0,150 g., Vitamina E 0,750 g., Edetato de Cobre y Zinc 22,500 mL., Selenito de Sodio 0,006 g., D-L Metionina 1,500 g., Fosfato Diácido de Potasio 0,200 g., Excipientes c.s.p. 100,000 mL.
Administración: Subcutánea.
Dosis: Administrar por vía subcutánea. **Novillos y vaquillonas:** 5 ml., **Vacas y toros:** 10 ml., **Ovinos, porcinos y terneros:** 3 ml., **Corderos y capones:** 2ml.
Se sugiere utilizar cada 60 días.
Presentación: Viales de 100 ml, 250 ml y 530 ml.

FLEANET POUR ON

Uso: Bovinos y Porcinos.
Acción: Antiparasitario de uso externo mosquicida y repelente. Uso Pour On.
Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de la Mosca de los cuernos (Haematobia irritans, Horn fly) en bovinos. Puede utilizarse para el tratamiento y la prevención de infestaciones por piojos en bovinos y porcinos.
Composición: Cipermetrina 5 g., Fenitrotión 4 g., Butóxido de Piperonilo 1 g., Exipientes c.s.p 100 ml.
Administración: Aplicación por derrame cutáneo (sistema Pour On).
Dosis: Bovinos: Hasta 400 kg: 10 ml totales.Más de 400 kg: 20 ml totales.
PERIODO DE RETIRO: Periodo prefaena 7 dias. No deja residuos en leche. Apto para vacas en ordeñe.
Presentación: Bidones autodosificadores por 1 litro . Solución oleosa de uso externo.

FLEANET AG PLATA

Uso: Caballos, Bovinos, Ovinos, Caprinos, Cerdos y Caninos.
Acción: Curabicheras en aerosol – Antimiásico – Antiséptico – Repelente – Cicatrizante.
Indicaciones: Prevención y tratamiento de la miasis, en heridas en general, descole, castraciones, descorne, ombligo del recién nacido. En operaciones quirúrgicas, protegiendo la herida de una posible infección. Posee gran poder de volteo, penetración y adherencia.
Composición: Fenitrotión: 0,538 g; Cipermetrina al 92% 0,423 g; Polvo de aluminio: 1,538 g; Sulfadiazina de plata: 0,038 g; Agentes de Formulación y gases Propano/Butano c.s.p. 100 g.
Administración: Uso externo. Rociar la zona afectada sosteniendo el aerosol a 15/20 cm del área a tratar.
Dosis: Aplicar una o dos veces por día durante cuatro o cinco días.
Presentación: Aerosol de 440 mL/16 Oz. Válvula de doble acción con sistema autolimpiante. Pulsador y actuador plano de aspersión controlada.
Periodo de retiro: 7 días entre el último tratamiento y el sacrificio. 72 horas en leche después del último tratamiento.

BATOXIL L.A.

Uso: Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Aves de Corral.
Acción: Antimicrobiano, Antibiótico Tetraciclina
Indicaciones: Es un antibiótico de efectiva acción contra un amplio espectro de bacterias Gram positivas y Gram negativas. Micoplasmas, Clamideas, Rickettsias y algunos hongos y protozoos patógenos.
Composición: Oxitetraciclina Base 20,00 g; Excipientes c.s.p. 100 mL.
Administración: Inyectable. Vía IM.
Dosis: Bovinos, Ovinos, Porcinos, y Caninos: 1 mL cada 10 kg de peso (20 mg/kg). **Aves:** 0,25 mL por kilo de peso por vía subcutánea (50 mg/kg)
Interacciones con otras drogas: No combinar con agentes bactericidas como son los derivados de las penicilinas.
Presentación: Viales por 100, 250 y 500 mL. Solución inyectable estéril.
Período de retiro: 28 días antes del sacrificio deben pasar desde la última aplicación.

PROFIT

Uso: Animales de las especies bovinas, porcinas y equinos y pequeños rumiantes en la última etapa de engorde, desarrollo y crecimiento.

Acción: Solución inyectable oleosa que actúa como promotor de crecimiento, desarrollo y engorde para animales productores de carne.

Indicaciones: Incrementan la ganancia de peso diaria, aumentan la conversión alimenticia de proteína a musculo, promueven la captación y retención de nitrógeno, vitaminas y minerales dietarios.

Composición: Testosterona Propionato 5,20 g., Vitamina A (Palmitato) 1 g., Vitamina E (Acetato) 1 g., Excipientes c.s.p. 100 ml.

Administración: Vía subcutánea exclusivamente.

Dosis: Se sugiere 1 ml cada 50 kg de peso.

Dosis máxima recomendada: 10 ml totales.

Intervalo entre dosis: La dosis sugerida podrá ser repetida, en ciclos de engorde continuo, cada 60 a 90 días.

Presentación: Vial de 250 ml y 100 ml.

Período de retiro: 30 días para sacrificar desde la última aplicación.

VIUSID VET

Uso: Equinos, Bovinos, Porcinos, Aves (Pollos de engorde, Gallinas Ponedoras y Reproductoras, Pavos, Ovejas y Conejos de cualquier edad).

Acción: VIUSID VET actúa sobre el crecimiento de los animales reforzando su sistema inmunológico, aumenta el apetito y es un excelente antioxidante, antiviral y hepatoprotector.

Indicaciones: Está recomendado para satisfacer los requerimientos en vitaminas y oligoelementos de los animales de granja durante periodos de estrés y enfermedad, o durante cambios de alimentación, fases críticas de crecimiento y preparación para la reproducción. **VIUSID VET** actúa sobre el crecimiento de los animales reforzando su sistema inmunológico, aumenta el apetito y es un excelente antioxidante, antiviral y hepatoprotector, ideal también para procesos que causan inmunodeficiencia, la activación de los ingredientes de VIUSID incrementa en gran medida el poder de las funciones biológicas de ellos, garantizando un aumento significativo en la producción.

Composición: Acido Málico, Glucosamina, Arginina, Glicina, Acido Ascórbico, Glicirricinato Monoamónico, Clorhidrato de Piridoxina, Sulfato de Zinc, Pantotenato Cálcico, Ácido Fólico, Cianocobalamina, Benzoato Sódico, Sorbato Potásico, Maltodextrina, Carbonato Cálcico, Dióxido de Silicio.

Administración: Diluido en agua o en alimento.

Dosis: Polvo: Mezclar Viusid Vet polvo con el concentrado 1 Kg de Viusid Vet polvo por cada 1,000 kg de concentrado (22 quintales) durante todo el ciclo de producción.

Líquido: Mezclar Viusid Vet liquido 1 litro por cada 1,000 litros de agua de bebida durante todo el ciclo de producción.

Presentación: Polvo: 1 Kilo, **Liquido:** 150 ml., 1 litro

HEPATONE

Uso: Equinos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.
Acción: Protector y estimulante de la función hepática.
Indicaciones: Protege y estimula la actividad hepática. Disfunciones hepáticas como hepatitis, insuficiencia hepática, intoxicaciones por plomo, mercurio, arsénico. Intoxicaciones alimentarias. Cetosis.
Composición: Sorbitol: 21 g; D-L Metionina: 1,5 g; Tiamina HCl: 0,30 g; Ácido Tióctico: 0,20 g; Excipientes c.s.p. 100 mL.
Administración: Inyectable por vía intramuscular.
Dosis: Caballos y Bovinos: 50 a 100 mL totales. **Porcinos:** 10 a 20 mL. **Ovinos:** 5 a 10 mL.
Caninos y Felinos: 1 mL cada 10 kg de peso.
Presentación: Vial por 50 ml, 100 mL, 250 ml.

DEXA 20

Uso: Caballos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.
Acción: Antiinflamatorio glucocorticoide de alta concentración y efecto rápido.
Indicaciones: Potente antiinflamatorio corticosteroide de máxima concentración y acción ultra rápida. Indicado en estados de shock, broncoespasmo, traumatismos craneoencefálicos, compresión medular, raquialgia, neuralgias y neuropatías, artropatías, enfermedades autoinmunes y síndrome anoréxico.
Composición: Dexametasona 21 Fosfato disódico a la máxima concentración de 2 g., Excipiente c.s.p. 100 mL.
Administración: Inyectable por todas la vías.
Dosis: Caballos, Bovinos, Ovinos y Porcinos: 0,05 a 0,2 mg/Kg;
Caninos y Felinos: 0,1 a 2 mg/Kg.
Dosis de shock: 4 a 8 mg/Kg en todas las especies.
Presentación: Viales por 20 mL.

ESTREPTOPENDIBEN

Uso: Equinos, Bovinos y Porcinos.

Acción: Antibiótico inyectable de amplio espectro de acción antibacteriana y su efecto es bactericida. Simultáneamente controla la hipertemia del síndrome febril, el dolor y la congestión característica de los procesos sépticos. La vitamina C que contiene ayuda a mejorar las condiciones fisiológicas para combatir el estrés.

Indicaciones: Neumonías, bronconeumonías, neumoenteritis, nefritis, pielonefritis, cistitis, metritis, hepatitis, mastitis, septicemias, adenitis equina, abscesos interdigitales, actinomicosis, carbunco bacteriano, tétanos, leptospirosis. En todos los casos de infecciones provocadas por gérmenes sensibles a la penicilina o estreptomicina en bovinos y equinos.

Composición: cada frasco con polvo contiene penicilina sódica, 2,000,000 UI; Penicilina Benzatínica, 2,500,00 UI; estreptomicina (como sulfato), 2,000 mg; dipirona, 1,000 mg. Cada ampolla con solvente contiene: Vitic, 1100 mg; Clorhidrato de Lidocaina, 60 mg; excipientes c.s.p. 16 ml.

Administración: Vía inyectable intramuscular profunda.

Dosis: Bovinos y equinos: 3.2 mL cada 100 kg. Por lo general una sola inyección es suficiente. Si persistieran los síntomas puede ser repetida la aplicación a las 24-48 horas.

PERIODO DE RETIRO No sacrificar animales para consumo humano hasta haber transcurrido 30 días del último tratamiento. No destinar para consumo humano o industrialización, la leche proveniente de animales tratados hasta haber transcurrido 8 ordeñes (4 días) desde el último tratamiento.

Presentación: Contiene 1 frasco con polvo y 1 ampolla con solvente (16 ml) .

EQUIVERM

Uso: Caballos deportivos. Medicación sin restricciones pre competencia.
Acción: Antiparasitario endectocida de amplio espectro. Controla parásitos gastrointestinales y pulmonares
Indicaciones: Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, pulmonares, cestodos y estados larvarios de dípteros causantes de miasis. Contribuye al control de piojos. Gel de administración oral.
Composición: Ivermectina 2 g, Praziquantel 10 g, Excipiente c.s.p. 100 g.
Administración: Gel de administración oral.
Dosis: Caballos, 1 g / 100 kg de peso.
Presentación: Jeringas dosificadoras de 6 y 18 gramos, gel oral con sabor a manzana.

GASTRINE 7 DAYS

Uso: Caballos.
Acción: Antisecretor y Antiulceroso, pasta de administración oral.
Indicaciones: Es un antisecretor, antiulceroso indicado para el tratamiento de esofagitis, gastritis erosiva, úlceras gastroduodenales y la prevención y tratamiento de las erosiones gástricas causadas por drogas ulcerogénicas.
Composición: Omeprazol 40,00 g, Esencia de manzana 0,10 g, Excipientes c.s.p. 100,00 g.
Administración: Una vez por día, preferentemente en la mañana antes de alimentarlo.
Se recomienda la administración durante 28 días consecutivos, pudiendo luego disminuir la dosis a la mitad y continuar 28 días más, para evitar que la afección reaparezca luego de su remisión.
Dosis: 4 mg/kg por día. Equivale a 1 gramo del producto cada 100 kilos de peso.
Una jeringa de 31,5 g alcanza para 7 dosis, para un equino promedio de 450 kilos de peso.
Presentación: Jeringa dosificadora de 31,5 g de pasta oral saborizada. (Rinde 7 Dosis).

BUTAFLEX

Uso: Caballos y Caninos.
Acción: Antiinflamatorio no esteroide, de acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria.
Indicaciones: Uso en diversas alteraciones asociadas con el sistema músculo esquelético, laminitis aguda, artritis, espondilitis, osteoartritis, tendinitis, tenosinovitis aguda, capsulitis, bursitis y reumatismo, disminuyendo el dolor y la inflamación de los tejidos, así como la fiebre en infecciones virales.
Composición: Fenilbutazona 20 g, Excipiente c.s.p. 100 mL.
Administración: Inyectable. Vía EV lenta. Inyectable por vía subcutánea o intramuscular es irritante, pudiendo llegar incluso a la necrosis. No exceda la dosis propuesta en el prospecto.
Dosis: Caballos: 1 a 2 g/454 kg (2,2 a 4,4 mg/kg o 0,55 a 1,1ml/50kg) por día, en el primer día, luego reducir la dosis a la mitad por cuatro días más. No exceder los 4g por día.
Caninos: 22 mg/kg/día, (1,1ml/10kg) dividido en 3 dosis, (no exceder los 800 mg/día, independientemente del peso del perro).
Presentación: Viales por 100 mL.

TOP RACE

Uso: Caballos.
Acción: Solución iónica balanceada de alto valor energético indicado en la prevención y tratamiento de la disfunción neuromuscular en equinos de alta performance.
Top Race compensa el equilibrio iónico y el balance de magnesio, calcio y potasio (elementos esenciales en el medio interno, equilibrio ácido base, función y dinámica muscular, repositor de pérdidas por sudoración).
Indicaciones: Como terapéutica de apoyo en el síndrome de sobre entrenamiento y fatiga del equino deportivo. Distrofia o disfunción muscular post operatorios con decúbitos prolongados o largas anestesias. Preventivo antes y después del ejercicio intenso. Síndrome de mala performance. Fatiga del ejercicio. Disturbios del medio interno (electrolítico y ácido base). Síndrome del equino exhausto, afluttera o asincronismo o aleteo diafragmático, rabdomiolisis, enfermedad de los lunes, enfermedad del músculo blanco y como energizante o complemento del balanceo dietético del equino deportivo. Problemas osteoarticulares o de desarrollo en animales jóvenes y antes y/o después del parto en yeguas. En intoxicaciones o sobremedicación con daño hepático.
Composición: Selenito de Sodio Anhidro 0,0026 g., Magnesio, Borogluconato 28,6893 g. Calcio, Borogluconato 2,4080 g., Potasio, Cloruro 0,0700 g., EDTA Disódico 0,0500 g. Agua Purificada Esteril csp 100,0000 mL.
Administración: Intravenosa lenta.
Dosis: Administrar 50 a 100 ml totales antes o después del ejercicio.
Esta dosis podrá ser suministrada diariamente durante la semana previa a la competencia.
Presentación: Viales por 530 mL. Solución inyectable estéril.

HEPATONE

Uso: Equinos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.
Acción: Protector y estimulante de la función hepática.
Indicaciones: Protege y estimula la actividad hepática. Disfunciones hepáticas como hepatitis, insuficiencia hepática, intoxicaciones por plomo, mercurio, arsénico. Intoxicaciones alimentarias. Cetosis.
Composición: Sorbitol: 21 g; D-L Metionina: 1,5 g; Tiamina HCl: 0,30 g; Ácido Tióctico: 0,20 g; Excipientes c.s.p. 100 mL.
Administración: Inyectable por vía intramuscular.
Dosis: Caballos y Bovinos: 50 a 100 mL totales. **Porcinos:** 10 a 20 mL. **Ovinos:** 5 a 10 mL.
Caninos y Felinos: 1 mL cada 10 kg de peso.
Presentación: Vial por 50 ml, 100 mL, 250 ml.

GASTRINE INJECTION

Uso: Equino deportivos.
Acción: Antiácido, antiemético y proquinético gastrointestinal.
Indicaciones: Control de vómitos asociados con trastornos eméticos debido a estimulación de la ZQG o depresión de la motilidad gastrointestinal. Quimioterapia oncológica, reflujo gastrointestinal. Úlceras o neoplasia gástrica. Dilatación gástrica postoperatoria y cirugía / intervención del vólvulo. Motilidad gástrica anormal. Tratamiento y prevención del síndrome de ulceración gástrica. Procesos inflamatorios gastrointestinales inmunomediados. Esofagitis por reflujo, cuerpos extraños, cáusticos o vómito crónico.
Composición: Ranitidina: 2 g; Metoclopramida: 0,5 g; Excipientes c.s.p. 100 mL
Administración: Inyectable por todas la vías.
Dosis: 0,8ml de GASTRINE INJECTION cada 100 kg/h en infusión continua.
(Metoclopramida: 0,04mg/kg/h diluido en infusión continua EV, Ranitidina: 0,16 mg/kg/h en infusión continua EV.)IM, SC o EV
Presentación: Vial con 50 ml.

FLEANET AG PLATA

Uso: Caballos, Bovinos, Ovinos, Caprinos, Cerdos y Caninos.

Acción: Curabicheras en aerosol – Antimiásico – Antiséptico – Repelente – Cicatrizante.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de la miasis, en heridas en general, descole, castraciones, descorne, ombligo del recién nacido. En operaciones quirúrgicas, protegiendo la herida de una posible infección. Posee gran poder de volteo, penetración y adherencia.

Composición: Fenitrotión: 0,538 g; Cipermetrina al 92% 0,423 g; Polvo de aluminio: 1,538 g; Sulfadiazina de plata: 0,038 g; Agentes de Formulación y gases Propano/Butano c.s.p. 100 g.

Administración: Uso externo. Rociar la zona afectada sosteniendo el aerosol a 15/20 cm del área a tratar.

Dosis: Aplicar una o dos veces por día durante cuatro o cinco días.

Presentación: Aerosol de 440 mL/16 Oz. Válvula de doble acción con sistema autolimpiante. Pulsador y actuador plano de aspersión controlada.

Periodo de retiro: 7 días entre el último tratamiento y el sacrificio. 72 horas en leche después del último tratamiento.

PROFIT

Uso: Animales de las especies bovinas, porcinas y equinos y pequeños rumiantes en la última etapa de engorde, desarrollo y crecimiento.

Acción: Solución inyectable oleosa que actúa como promotor de crecimiento, desarrollo y engorde para animales productores de carne.

Indicaciones: Incrementan la ganancia de peso diaria, aumentan la conversión alimenticia de proteína a musculo, promueven la captación y retención de nitrógeno, vitaminas y minerales dietarios.

Composición: Testosterona Propionato 5,20 g., Vitamina A (Palmitato) 1 g., Vitamina E (Acetato) 1 g., Excipientes c.s.p. 100 ml.

Administración: Vía subcutánea exclusivamente.

Dosis: Se sugiere 1 ml cada 50 kg de peso.

Dosis máxima recomendada: 10 ml totales.

Intervalo entre dosis: La dosis sugerida podrá ser repetida, en ciclos de engorde continuo, cada 60 a 90 días.

Presentación: Vial de 250 ml y 100 ml.

Período de retiro: 30 días para sacrificar desde la última aplicación.

VIUSID VET

Uso: Equinos, Bovinos, Porcinos, Aves (Pollos de engorde, Gallinas Ponedoras y Reproductoras, Pavos, Ovejas y Conejos de cualquier edad).

Acción: VIUSID VET actúa sobre el crecimiento de los animales reforzando su sistema inmunológico, aumenta el apetito y es un excelente antioxidante, antiviral y hepatoprotector.

Indicaciones: Está recomendado para satisfacer los requerimientos en vitaminas y oligoelementos de los animales de granja durante periodos de estrés y enfermedad, o durante cambios de alimentación, fases críticas de crecimiento y preparación para la reproducción. **VIUSID VET** actúa sobre el crecimiento de los animales reforzando su sistema inmunológico, aumenta el apetito y es un excelente antioxidante, antiviral y hepatoprotector, ideal también para procesos que causan inmunodeficiencia, la activación de los ingredientes de VIUSID incrementa en gran medida el poder de las funciones biológicas de ellos, garantizando un aumento significativo en la producción.

Composición: Acido Málico, Glucosamina, Arginina, Glicina, Acido Ascórbico, Glicirricinato Monoamónico, Clorhidrato de Piridoxina, Sulfato de Zinc, Pantotenato Cálcico, Ácido Fólico, Cianocobalamina, Benzoato Sódico, Sorbato Potásico, Maltodextrina, Carbonato Cálcico, Dióxido de Silicio.

Administración: Diluido en agua o en alimento.

Dosis: Polvo: Mezclar Viusid Vet polvo con el concentrado 1 Kg de Viusid Vet polvo por cada 1,000 kg de concentrado (22 quintales) durante todo el ciclo de producción.

Líquido: Mezclar Viusid Vet liquido 1 litro por cada 1,000 litros de agua de bebida durante todo el ciclo de producción.

Presentación: Polvo: 1 Kilo, **Liquido:** 150 ml., 1 litro

ESTREPTOPENDIBEN

Uso: Equinos, Bovinos y Porcinos.

Acción: Antibiótico inyectable de amplio espectro de acción antibacteriana y su efecto es bactericida. Simultáneamente controla la hipertemia del síndrome febril, el dolor y la congestión característica de los procesos sépticos. La vitamina C que contiene ayuda a mejorar las condiciones fisiológicas para combatir el estrés.

Indicaciones: Neumonías, bronconeumonías, neumoenteritis, nefritis, pielonefritis, cistitis, metritis, hepatitis, mastitis, septicemias, adenitis equina, abscesos interdigitales, actinomicosis, carbunco bacteriano, tétanos, leptospirosis. En todos los casos de infecciones provocadas por gérmenes sensibles a la penicilina o estreptomicina en bovinos y equinos.

Composición: cada frasco con polvo contiene penicilina sódica, 2,000,000 UI; Penicilina Benzatínica, 2,500,00 UI; estreptomicina (como sulfato), 2,000 mg; dipirona, 1,000 mg. Cada ampolla con solvente contiene: Vitic, 1100 mg; Clorhidrato de Lidocaina, 60 mg; excipientes c.s.p. 16 ml.

Administración: Vía inyectable intramuscular profunda.

Dosis: Bovinos y equinos: 3.2 mL cada 100 kg. Por lo general una sola inyección es suficiente. Si persistieran los síntomas puede ser repetida la aplicación a las 24-48 horas.

PERIODO DE RETIRO No sacrificar animales para consumo humano hasta haber transcurrido 30 días del último tratamiento. No destinar para consumo humano o industrialización, la leche proveniente de animales tratados hasta haber transcurrido 8 ordeñes (4 días) desde el último tratamiento.

Presentación: Contiene 1 frasco con polvo y 1 ampolla con solvente (16 ml) .

EPITELIZANTE OCULAR

Uso: Equinos.

Acción: Ungüento oftálmico a base de Vitaminas A y E e Hidrolizado de Caseina.

Indicaciones: Tratamiento tópico de las queratoconjuntivitis ulcerativas en perros y gatos. También se puede utilizar como humectante ocular.

Composición: Cada 100 g de ungüento contiene: Caseína hidrolizada 2,5 g., Vitamina A, palmitato 1 g., Vitamina E, Acetato 0,1 g., Excipientes c.s.

Administración: Ungüento.

Dosis: Aplicar 1 a 2 cm de ungüento oftálmico estéril sobre la córnea o dentro del saco conjuntival, realizando luego un suave masaje sobre el párpado para lograr una buena distribución del producto. Repetir la administración cada 8 a 12 hs durante 7 días o según el criterio del médico veterinario.

Presentación: Pomo conteniendo 3,5 g, con aplicador oftálmico.

KETONAL 100

Uso: Equinos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Aves y Conejos.

Acción: Anestésico general disociativo.

Indicaciones: Anestesias generales cortas. Como agente anestésico único o combinado. Para producir una inmovilización del paciente con la finalidad de realizar maniobras quirúrgicas breves o procedimientos diagnósticos menores que no requieran de relajación muscular.

En anestesias de pacientes con riesgo aumentado ya que no compromete el sistema cardiorrespiratorio del animal. En operación cesárea debido a la ausencia de toxicidad fetal.

Composición: Ketamina, clorhidrato 10 g., Excipientes c.s.p. 100 ml.

Administración: Intramuscular, Endovenosa.

Dosis: Dosis orientativa media: Protocolos por especie: Aves: Vía intramuscular: 10 a 20 mg/kg.

Conejos: Vía intramuscular: 20 a 40 mg/kg., **Ovinos y porcinos:** Vía intramuscular o endovenosa: 15 a 20 mg/kg., **Bovinos:** Para procedimientos quirúrgicos mayores y menores: 2 mg/kg de peso vía endovenosa rápida. **Equinos:** Una combinación de Ketamina, Eter Gliceril guayacólico y Xilacina podrá ser aplicada para obtener una anestesia general óptima. Se administrará Xilacina 2,2 mg/kg intramuscular 20 minutos antes de la inducción con EGG, y luego una vez obtenido el decúbito se aplicará Ketamina 1,7 mg/kg endovenosa.

También se podrá administrar una dosis de ketamina de 2,2 mg/kg al mismo tiempo o seguida de la aplicación de Xilacina a 1,1 mg/kg vía endovenosa (cuatro minutos antes de la Ketamina). Esta combinación otorgará analgesia y anestesia corta pudiéndose recurrir a la intubación endotraqueal.

Presentación: Frasco de 100 ml.

ALGEN 20

Uso: Caballos deportivos

Acción: Analgésico.

Indicaciones: Control del dolor somático y/o visceral de grado moderado a severo y de origen agudo o crónico.

Composición: Tramadol Clorhidrato 2000 mg; Excipientes c.s.p. 100 mL.

Administración: Epidural, Endovenosa.

Dosis: Epidural: 1 – 2 mg/kg. Caballos deportivos. Vía infusión Endovenosa lenta, Epidural: 1 mg/kg.

LIDOCAÍNE

Uso: Bovinos, Equinos, Porcinos y ovinos.

Acción: Agente anestésico local y antiarrítmico de rápida acción.

Indicaciones: Está indicado para su uso local, tópico y para el tratamiento de arritmias ventriculares.

Anestesia infiltrativa de todo tipo. Anestesia y/o analgesia epidural. Bloqueo subaracnoideo. Anestesia paravertebral. Bloqueo de los nervios intercostales. Anestesia y/o analgesia intrapleural. Anestesia regional intravenosa (Bloqueo de Bier). Anestesia del plexo braquial. Infiltración del nervio mandibular, posterior a la realización de una mandibulectomía. Anestesia y/o analgesia epidural continua. Infiltración intraauricular. Bloqueo nervioso periférico (perineural o troncular) en equinos y bovinos, cirugía obstétrica, urogenital y correctora. Anestesias tronculares diagnósticas y cirugía ocular. Control de disrritmias cardíacas, principalmente la taquicardia ventricular paroxística, arritmias ventriculares y complejo ventricular prematuro.

Composición: Lidocaína, clorhidrato 2 g., Agentes de formulación c.s.p. 100 ml.

Administración: Lidocaine 2%, se administra en forma inyectable parenteral, por infiltración de tejidos en el plano intradérmico, subcutáneo, perineural y/o intramuscular. La vía endovenosa se utilizará para el tratamiento de las arritmias específicamente o para realizar la técnica de anestesia regional endovenosa (bloqueo de Bier).

Dosis: Anestesia regional o local: Se toma como dosis orientativa general una dosis de 3 mg/kg de peso, equivalente a 0,15 ml/kg de peso. **Anestesia epidural:** La anestesia epidural se caracteriza por el bloqueo regional provocado por el anestésico una vez inyectado en el espacio epidural. Dicho bloqueo se produce en los nervios espinales, afectando las fibras simpáticas, sensitivas y motoras.

OBSERVACIONES Vías de aplicación: infiltrativa local, subcutánea, perineural, intramuscular, endovenosa (Bloqueo de Bier). **Anestesia de tejidos:** La dosis orientativa sugerida queda a consideración del profesional actuante, el cual estimará las cantidades según el requerimiento de la estructura a anestesiar y el tipo de maniobra a realizar.

Presentación: Vial de 100 ml.

BUPINEX VET

Uso: Equinos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.
Acción: Anestésico local.
Indicaciones: Moderno anestésico local de Acción Prolongada. Su potencia es de dos a cuatro veces mayor que la lidocaína. Está indicado para su uso como anestésico local cuando se requiera una insensibilización de la zona tratada por un período de tiempo comprendido entre 4 a 6 horas, considerando en especial, intervenciones quirúrgicas menores de larga duración.
Composición: Bupivacaína Clorhidrato 0,50 g; Excipientes c.s.p. 100 mL.
Administración: Solución inyectable estéril lista.
Dosis: Dosis general de referencia 0,25 mg/kg de peso; equivalente a 0,05 mL/kg de peso aproximadamente. **Caninos y Felinos:** 1 mL cada 4,5 kg de peso. **Porcinos:** 1mL cada 10 kg de peso. **Caballos:** 1 mL cada 100 kg de peso. **Bovinos:** 8 a 10 mL totales.
Presentación: Vial de 50 ml.

MIDAZOLAM

Uso: Equinos, caninos y felinos.
Acción: Benzodiazepina hipnótica de última generación.
Indicaciones: Su uso está indicado solo o combinado con analgésicos, parasimpaticolíticos y agentes anestésicos según diferentes protocolos.Midazolam, ejerce una acción sedante e hipnoinductora muy rápida, intensa y breve. Tiene asimismo propiedades ansiolíticas, anticonvulsivantes, tranquilizantes y miorrelajantes.
Como parte de la medicación preanestésica puede utilizarse solo o combinado con analgésicos, para simpaticolíticos (atropina), etc. **Para procedimientos diagnósticos y quirúrgicos menores:** Pudiendo combinarse con Ketamina o Xilacina. **Como inductor de la anestesia en pacientes normales y en pacientes críticos:** Combinado con Ketamina, Tiopental, Propofol etc. Cirugía intraocular en equinos. Contracturas musculares: en pacientes con síndrome simpático post traumático, en pacientes con síndrome doloroso por discopatías.
Composición: Midalozam 0,5 g., Agentes de formulación c.s.p. 100 ml.
Administración: Solución inyectable estéril lista.
Dosis: Dosis máxima sugerida de Midazolam: hasta 1 mg/kg.
Dosis hipnótica: en todas las especies, para lograr un efecto hipnótico, se deberán duplicar las dosis anteriormente sugeridas. A diferencia del Diazepam, su administración intramuscular es muy bien tolerada al igual que su respuesta.A estas dosis y utilizando el Midazolam como premedicación anestésica, se deberá reducir la dosis de los agentes inductores (barbitúricos) hasta en un 50% de la dosis calculada sin premedicación para dichos agentes.
Presentación: Vial de 20 ml.

DAZAM

Uso: Equinos deportivos, Caninos y Felinos.
Acción: Tranquilizante psicotrópico / Benzodiacepina.
Indicaciones: Dazam está indicado como tranquilizante menor, sedante, ansiolítico, relajante muscular central y anticonvulsivante. Puede ser utilizado como orexígeno (estimulante del apetito). Se utiliza en combinación con otras drogas en la premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia.
Composición: Diazepam 0,50 g; Excipientes c.s.p. 100 mL.
Administración: Endovenosa.
Dosis: Inducción y mantenimiento anestésico: Caballos Deportivos: Su uso es exclusivo EV. **Sedante/Preanestésico:** 0,05 – 0,2 mg/kg IV. **Inducción y Mantenimiento:** Xilacina- Diazepam-Ketamina 0,5-1mg/ kg—0,2mg/kg—1,5-2 mg/kg. **Anticonvulsivo: Potrillos:** 0,05 – 0,4 mg/kg IV.
Adultos: 25 – 50 mg totales IV
Presentación: Vial de 20 ml.

BUTORMIN

Uso: Equinos.
Acción: Analgésico, opioide sintético agonista-antagonista, con una potencia mayor a la de la morfina y mínimos efectos cardiovasculares.
Indicaciones: Analgesia pre, intra y postquirúrgico. Se puede administrar junto con la premedicación.
Potenciar los efectos sedantes de los tranquilizantes:
Midazolam - Diazepam - Acepromazina, con esta última, mejora la sedación sobre todo en razas caninas medianas y grandes. Puede combinarse durante la anestesia con Ketamina.
Composición: Cada 100 ml de la solución contiene: Butorfanol tartrato 1,02 g.,
Excipientes c.s.
Administración: Aplicado intramuscular, la analgesia se logra a los 30 minutos, alcanzando el pico a la hora. En administración endovenosa el efecto inmediato. Se sugiere administrar lentamente por esta vía. No produce depresión respiratoria.
Dosis: La indicada por el médico veterinario. Por vía endovenosa, intramuscular o subcutánea.
Presentación: Frasco ampolla por 10 ml.
No debe usarse en pacientes con hepatopatía severa, insuficiencia renal grave, insuficiencia cardíaca o enfermedades respiratorias obstructivas. No usar en hembras preñadas ya que no hay estudios sobre sus efectos durante esta condición.

ATRIBEN

Uso: Equinos

Acción: Antiinflamatorio esteroide. La Triamcinolona es un sintético fluorado con una potencia glucocorticoidea 5 veces mayor al cortisol, sin efecto mineralocorticoideo (retención de sodio) y con una duración de acción prolongada por la sal que la acompaña. Antiprurítico, Antialérgico, Inmunosupresión.

Indicaciones: Procesos inflamatorios: artritis traumática, tenosinovitis, miositis, etc. Dermatitis alérgicas, Prurito inespecífico, Neoplasias, Enfermedades autoinmunes.

Composición: Cada 100 ml de la suspensión contiene:
Triamcinolona acetonida 0,6 g., Excipientes c.s.

Administración: Intramuscular, subcutánea, interarticular e intrasinovial.

Dosis: La que el Médico Veterinario recomiende.

Presentación: Frasco ampolla de 20 ml.

Restricciones de uso: Último tercio de la gestación. Animales inmunosuprimidos. Procesos inflamatorios: artritis traumática, tenosinovitis, miositis, etc., Dermatitis alérgicas, Prurito inespecífico, Neoplasias, Enfermedades autoinmunes.

BUTAFLEX

Uso: Caballos y Caninos.

Acción: Antiinflamatorio no esteroide, de acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria.

Indicaciones: Uso en diversas alteraciones asociadas con el sistema músculo esquelético, laminitis aguda, artritis, espondilitis, osteoartritis, tendinitis, tenosinovitis aguda, capsulitis, bursitis y reumatismo, disminuyendo el dolor y la inflamación de los tejidos, así como la fiebre en infecciones virales.

Composición: Fenilbutazona 20 g, Excipiente c.s.p. 100 mL.

Administración: Inyectable. Vía EV lenta. Inyectable por vía subcutánea o intramuscular es irritante, pudiendo llegar incluso a la necrosis. No exceda la dosis propuesta en el prospecto.

Dosis: Caballos: 1 a 2 g/454 kg (2,2 a 4,4 mg/kg o 0,55 a 1,1ml/50kg) por día, en el primer día, luego reducir la dosis a la mitad por cuatro días más. No exceder los 4g por día.

Caninos: 22 mg/kg/día, (1,1ml/10kg) dividido en 3 dosis, (no exceder los 800 mg/día, independientemente del peso del perro).

Presentación: Viales por 100 mL.

DEXA 20

Uso: Caballos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.
Acción: Antiinflamatorio glucocorticoide de alta concentración y efecto rápido.
Indicaciones: Potente antiinflamatorio corticosteroide de máxima concentración y acción ultra rápida. Indicado en estados de shock, broncoespasmo, traumatismos craneoencefálicos, compresión medular, raquialgia, neuralgias y neuropatías, artropatías, enfermedades autoinmunes y síndrome anoréxico.
Composición: Dexametasona 21 Fosfato disódico a la máxima concentración de 2 g., Excipiente c.s.p. 100 mL.
Administración: Inyectable por todas la vías.
Dosis: Caballos, Bovinos, Ovinos y Porcinos: 0,05 a 0,2 mg/Kg;
Caninos y Felinos: 0,1 a 2 mg/Kg.
Dosis de shock: 4 a 8 mg/Kg en todas las especies.
Presentación: Viales por 20 mL.

INELTANO VET

Uso : Caballos, Aves ornamentales y Reptiles.
Acción: Anestésico general inhalatorio.
Indicaciones: Anestésico general de uso por vía inhalatoria. Recomendado en pacientes debilitados y en aquellos con alteraciones hepáticas o renales.
Composición: Isoflurano 100%.
Administración: Inyectable por vías subcutánea (SC); intramuscular (IM); o endovenosa (EV).
Dosis: Inducción: 3 a 5 %. **Mantenimiento:** 1,5 – 1,8 %.
Reptiles: Mantenimiento: 3 – 5 %. Aves ornamentales: 4%.
INTERACCION CON OTRAS DROGAS: No corresponde.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: No usar en pacientes con historia de hipertermia maligna.
Usar con precaución en pacientes con falla hepática severa, arrtimias cardíacas, miastenia gravis. Raramente puede producir hipotensión, depresión cardíaca o disritmias.
Presentación: Frasco de 100 ml.

VIVIRAN

Uso: Equinos.

Acción: Analéptico estimulante cardio-respiratorio, a través de los quimiorreceptores carotídeos. Con dosis mayores se estimula los centros respiratorios a nivel del SNC.

Indicaciones: En animales con depresión ventilatoria por barbitúricos, buprenorfina, xilacina y agentes inhalados. Acelera la recuperación post anestésica. Estimula el inicio de la respiración en nonatos deprimidos. Para la medición del tiempo circulatorio en caballos.

Composición: Cada 100 ml de la solución contiene: Doxapram clorhidrato 2 g., Excipientes c.s.

Administración: Vía endovenosa exclusivamente.

Dosis: Equinos: 0,5 mg / kg (equivalentes a 2,5 ml. cada 100 kg de peso) EV. Esta dosis puede repetirse a los 15-20 min.

Presentación: Frasco ampolla por 10 ml.

Efectos colaterales: Doxapram produce un incremento ininterrumpido de la frecuencia cardíaca durante el primer minuto post administración, así como alteraciones de la magnitud y polaridad de la onda T visible en el ECG. Ambos efectos son transitorios y no potenciados con una segunda administración del producto.

Restricciones de uso; No usar en hembras gestantes.

XILACINA 20

Uso: Equinos, Bovinos, Ovinos, Porcinos y Aves.
Acción: Potente sedante, miorrelajante y analgésico no narcótico.
Indicaciones: Procedimientos quirúrgicos menores de corta duración, como sutura de laceraciones. Como agente pre-anestésico, disminuyendo así la dosis necesaria de agentes anestésicos. Procedimientos ortopédicos, examen semiológico en boca, orejas, palpación abdominal, rectal, o vaginal. Cateterismo y radiografías. Odontología. Utilizado en conjunto con anestésicos locales.
Composición: Xilacina, clorhidrato: 2 g., Vehículos y excipientes c.s.p.: 100 ml.
Administración: Inyectable por vías subcutánea (SC); intramuscular (IM); o endovenosa (EV).
Dosis: La dosis específicas dependerán de las condiciones de uso y aplicación del mismo.
Equinos: Endovenoso (EV) 0,5 a 1,1 mg/kg equivalentes a 2,5 a 5,5 ml. cada 100 kg de peso; intramuscular (IM) 1 a 2 mg/kg equivalentes a 5 a 10 ml. cada 100 kg de peso.
Bovinos: Endovenoso (EV) 0,03 a 0,1 mg/kg equivalentes a 0,15 a 0,5 ml. cada 100 kg de peso; intramuscular (IM) 0,1 a 0,2 mg/kg equivalentes a 0,5 a 1 ml. cada 100 kg de peso.
Ovinos: Endovenoso (EV) 0,5 a 1,1 mg/kg equivalentes a 0,03 a 0,1 ml. cada 50 kg de peso; intramuscular (IM) 0,1 a 0,3 mg/kg equivalentes a 0,25 a 0,75 ml. cada 50 kg de peso. **Cabra:** Endovenoso (EV) 0,01 a 0,5 mg/kg equivalentes a 0,02 a 1,25 ml. cada 50 kg de peso; intramuscular (IM) 0,05 a 0,5 mg/kg equivalentes a 0,12 a 0,5 ml. cada 50 kg de peso. **Cerdo:** Intramuscular (IM) 2 a 3 mg/kg equivalentes a 5 a 7,5 ml. cada 50 kg de peso.
Aves: Intramuscular (IM) 5 a 10 mg/kg equivalentes a 1,25 a 2,5 ml. cada 5 kg de peso.
Presentación: Frasco de 20 ml.

Yohimbine VET UP

Uso: Equinos, Perros, Gatos, Ciervos y Venados.
Acción: Antagonista específico de los receptores alfa 2 adrenérgicos.
Indicaciones: Reversor específico de los efectos de la Xilacina y Medetomidina – DETOR. Actúa revirtiendo los efectos de la misma como: bradicardia, depresión respiratoria y meteorismo en rumiantes, logrando una rápida recuperación del animal.
Composición: Yohimbina Clorhidrato 0,2 g. Excipiente c.s.p. 100 mL.
Administración: Inyectable. Vía EV.
Dosis: Caballos: 0,075 mg/Kg; **Perros:** 0,1 mg/Kg; Gatos: 0,5 mg/Kg; **Ciervos y Venados:** 0,2–0,3 mg/Kg.
Presentación: Viales por 10 mL. Solución inyectable estéril.

VIUSID agro®

ICONO PLANTAS

Uso: Aumento de la producción de cultivos como: granos, hortalizas, frutales, raises y tubérculos, plantas ornamentales, tratamiento de semillas, pastos mejorados y pasto de corte,

Acción: Actúa como promotor de crecimiento vegetal, bioregulador natural que estimula el desarrollo de las plantas aumentando así la productividad de los cultivos.

Indicaciones: Indicado para cultivos como Hortalizas (Lechuga, cebolla, tomate, pepino, etc), Frutales (papaya, mango), Cucurbitaceas (Sandía, Melón, Zapallo), Granos (Maíz, frijol, poroto, soya, guandú) Ornamentales (rosas, orquídeas, anturio, etc) Otros (Tabaco, plátanos) y Pastos (brachiaria, gramíneas).

Descripción: • Contribuye en la activación del desarrollo vegetativo de los brotes, puesto que produce agrandamiento y multiplicación de las células, actúa a concentraciones extremadamente bajas, es traslocado en el interior de la planta y, generalmente, sólo afecta a las partes aéreas. • Actúa induciendo la floración y el alargamiento del tallo. • Provoca ruptura de la latencia o adormecimiento de las semillas mejorando el % de germinación. • Inhibe la caída de flores y por consiguiente aumenta el número de frutos. • Retarda o acelera (dependiendo de las dosis usadas) la maduración de frutos sin cambiar la calidad de éstos, en especial lo relacionado con contenido de carbohidratos y azúcares. • Mejora el Brix de los frutos. • Actúa incrementando los rendimientos de los cultivos, con frutos más homogéneos y grandes. • Aumenta el follaje y % de Biomasa. • Actúa directamente sobre el sistema radicular mejorando su desarrollo.

Composición: Ascophyllum Nodosum, Fosfato de Potásico, Ácido Málico, Glucosamina, Ácido Aspártico, Arginina, Glicina, Triptófano, Ácido Ascórbico, Sulfato de Zinc, Pantotenato Cálcico, Piridoxina, Ácido Fólico, Cianocobalamina, Glicirricinato Monoamónico, Benzoato Sódico, Sorbato Potásico. Todos ellos con el proceso de Bioactivación Molecular.

Dosificación: Dependiendo del uso va de 0.3 ml. a 1.5 ml. por litro de agua para la aplicación foliar y 1 ml por cada 5 litros en aplicación por fertirriego.

Presentación: Frasco de 30 ml, 150 ml, 1 litro y 5 litros.

VIUSID APIS

Uso: Abejas.

Acción: Es un preparado nutricional compuesto por antioxidantes, vitaminas, oligoelementos y una sustancia que se extrae de la raíz del regaliz (ácido licirricínico) con propiedades antivirales. Está especialmente diseñado para el aumento de las defensas inmunológicas. Ideal, por tanto, en todos aquellos procesos que causan inmunodeficiencia.

Indicaciones: Corregir desequilibrios y deficiencias nutricionales, asegurando un desarrollo continuo de las colonias en lugares y épocas de escasez de néctar y polen.

Aliviar el estrés del transporte. Incrementar la puesta y viabilidad de los huevos y, como consecuencia el número de panales de cría. Ayuda a restablecer y fortalecer la salud y la capacidad de defensa de la colmena, lo que favorece la formación de enjambres fuertes y sanos. Aumenta la productividad de la colmena. Terapia de soporte en enfermedades víricas y parasitarias.

Composición: Glucosamina, Maltodextrina, Arginina, Glicirricinato Monoamónico, Glicina, Ácido Ascórbico, Piridoxal, Ácido Fólico, Pantotenato Cálcico, Cianocabalamina, Ácido Málico, Sulfato de Zinc, Aroma de Hígado, Sorbato Potásico, Benzoato Sódico.

Administración: Diluido en jarabe de azúcar o miel.

Dosis: 1.5ml de Viusid Apis por litro de Jarabe de Azúcar.

Presentación: Frasco de 150 ml y 1 Litro.

ÁTOMO DESINFLAMANTE

Uso: Todas las especies.

Acción: La crema para los dolores. Analgésica y antiinflamatoria contra dolores musculares, articulares, reumáticos, artríticos, artrósicos, tendinosos y ligamentos, y para el tratamiento de hematomas.

Indicaciones: Salvo mejor criterio profesional ATOMO DESINFLAMANTE puede ser utilizado para tratar con favorables resultados todo tipo de dolores, musculares, tendinosos, articulares, ligamentos o nerviosos. Bien indicada para reumatismo muscular y articular, contusiones, esguinces, torceduras, neuritis, neuralgias, mialgias, dolores por esfuerzo, mastitis y hematomas, en equinos, bovinos, camélidos, ovinos, caprinos, porcinos.

Composición: Cada 100 g del producto contienen: Alcanfor 2,0g. Mentol 1,3g. Salicilato de Amilo 2,2g. Eucaliptol 1,1g. Guayacol 0,35g. Terpineol 2,0g. Excipientes y coadyuvantes: Metilparabeno, Ácido Esteárico, Cetomacrogol, Vaselina Sólida Blanca, Agua Purificada c.s.p. 100g.

Administración: Ungüento.

Dosis: Aplicar mínimo dos veces al día (mañana y noche) aplicando abundante cantidad de pomada en el lugar a tratar y friccionarla o masajearla por 5 a 10 minutos hasta que se produzca su absorción total. Cuanto más crónico el proceso a tratar, por mayor tiempo deberá prolongarse el uso de ATOMO DESINFLAMANTE.

Presentación: Potes x 50g.

ÁTOMO ORDEÑADOR

Uso: Todas las especies.

Acción: Crema hidrosoluble, atóxica, no transmite a la leche sabor ni olor. Actúa favorablemente en el proceso cicatrizal de heridas, grietas y raspaduras con efecto lubricante.

Indicaciones: Ha incorporado Aloe Vera en su formulación, para reforzar el efecto de las vitaminas A y F, de la Alantoína, la Nicotinamida y cumplir rápida y efectivamente su acción suavizante, antiséptica, cicatrizante, revitalizante y normalizadora de la piel. Asimismo protege la piel contra quemaduras por frío o calor y contrarresta los efectos nocivos de los rayos solares en todas las especies animales, sobre la piel. También está indicado en todo tipo de eflorescencias cutáneas, eczemas secos, furfuráceos, escamosos y descamativos con o sin prurito y como cicatrizante, bactericida y bacteriostático en general, en equinos, bovinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

Composición: Cada 100 g del producto contienen: Aloe Vera 3,0 g,,Cloruro de Benzalconio 0,3 g.,Cloruro de Bencetonio 0,4 g., Vitamina “A” Palmitato 50.000 UI, Vitamina F 1,0 g., Alantoína 0,5 g., Nicotinamida 0,5 g., Lidocaína 0,2 g., Glicerina 8,0 g., Metilparabeno 0,2 g., Ácido Esteárico 3,0 g., Krim 400 10,0 g., Vaselina blanca 4,0 g., Lanolina 2,0 g., Agua Purificada c.s.p. 100,0 g.

Administración: Ungüento.

Dosis: Aplicar en la zona a tratar una buena cantidad, en forma de masaje suave pero prolongado, hasta que desaparezca totalmente, antes y después del ordeñe, pudiendo repetir su aplicación, con mayor frecuencia si se hace necesario.

Presentación: Potes plásticos x 50 g.

ÁTOMO DERMOCUTÁN

Uso: Equinos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.

Acción: Indicado para dermatosis eritematosa, eflorescencias cutáneas, eczemas secos, escamosos, etc. Como cicatrizante, bactericida y bacteriostático.

Indicaciones: Es un producto indicado para tratar dermatosis eritematoscamosa de etiología desconocida, bien sean persistentes o con brotes repetidos y remisiones más o menos largas. También está indicado en todo tipo de eflorescencias cutáneas, eczemas secos, furfuráceos, escamosos o descamativos, con o sin pruritos y como cicatrizante, bactericida y bacteriostático en general en Equinos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos, Camélidos, Conejos, Caninos y Felinos.

Composición: Cada 100 g del producto contienen: Cloruro de Bencetonio 0,2 g. - Cloruro de Benzalconio 0,2 g. - Vitamina "A" Palmitato 100.000 UI - Lidocaina 0,2 g - Excipientes y vehiculizantes: Ácidos Grasos Esenciales (Vit. F) - Alantoína - Nicotinamida - Dietanolamida de Aceite de Coco - Glicerina - Metilparabeno - Ácido Esteárico - Cera Autoemulsionable catiónica - Vaselina Blanca - Lanolina - Agua purificada c.s.p. 100 g.

Administración: Ungüento.

Dosis: Se aplica en forma abundante en la zona afectada dos o más veces al día haciendo un masaje con ella hasta que se absorba completamente.

Presentación: Potes plásticos x 50 g.

CATÁLOGO 2022

Droguería e Importadora Alemana

catalysis

Biogénesis Bagó

Contáctenos **+507 203-8740**

Edificio De Lesseps, piso 5, oficina 1, Área Bancaria, Panamá

Email: **ventas@drogueriaalemana.com**

WWW.DROGUERIAALEMANA.COM