

Holliday



HOLLIDAY-SCOTT
ARGENTINA

ACEDAN GOTAS

Tranquilizante neuroléptico oral en gotas



INDICACIONES

Tranquiliza al animal. Evita náuseas y vómitos en viajes. Premedicación anestésica. Relajación uretral. Reducir la tensión arterial.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Acepromacina maleato 1 g.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 1 a 3 gotas por kg, VO.
Animales sensibles: 1 gota cada 2 kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la acepromacina. Animales deshidratados, cardiopatas, intoxicados, convulsivos, con preñez avanzada y cachorros menores de 2 meses.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero por 10ml.

ACEDAN INYECTABLE

Tranquilizante neuroléptico inyectable



INDICACIONES

Tranquiliza al animal. Premedicación anestésica. Reducir la tensión arterial. Relajación uretral.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Acepromacina maleato 1 g.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 0.1 mg/kg. SC, IM o EV (lenta). No superar los 3 mg vía IM o EV en perros y 1 mg en felinos.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la acepromacina. Animales deshidratados, cardiopatas, intoxicados, convulsivos, con preñez avanzada y cachorros menores de 2 meses.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla por 50ml.

ANAVIMIN COAT

Biomodulador dermacosmético



INDICACIONES

Pérdida de pelo y falta de brillo, stress, estados carenciales, alergias. Complemento en los tratamientos de dermatopatías.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Vitamina A, B2 y E, Ácido Ascórbico, L-cistina, Prolina, Calcio, Biotina, Gluconato de Zinc.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros hasta 10 kg: 1/2 comprimido por día.
Perros de 10 a 30 kg: 1 comprimido por día.
Perros de más de 30 kg: 2 comprimidos por día.

Gatos: 1/4 a 1/2 comprimido por día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes.

PRESENTACIÓN

Caja con 3 blísteres de 7 comprimidos cada uno.

APETIL

Anabólico, orexígeno y regulador del balance energético



INDICACIONES

Estados de convalecencia, desnutrición y anemias, trastornos del crecimiento, hepatopatías, nefropatías, osteopatías, fracturas, hipoproteínemia.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la suspensión contiene:
DL Carnitina HCL 7g, Estanozolol 0.4 g, Ciproheptadina HCL 0.2 g
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Cachorros y Gatos: 10 gotas/día durante 7 días.
Caninos adultos: 20 gotas/día durante 7 días.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con nefritis intersticial y/o insuficiencia cardíaca. Anuria. No administrar en hembras preñadas.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero con 10 ml.

ATRIBEN

Glucocorticoide de depósito



INDICACIONES

Procesos inflamatorios. Dermatitis alérgicas. Neoplasias. Enfermedades autoinmunes.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la suspensión contiene:
Triamcinolona acetónida 0,6 g
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 0.1 a 0.2 mg/kg SC o IM cada 15 días.

CONTRAINDICACIONES

Enfermedades infecciosas virales, micóticas y bacterianas. Demodectia. Gastritis. Pancreatitis. Insuficiencia renal. Diabetes mellitus. Osteoporosis. Artritis. Úlcera de córnea. Gestación.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla por 20 mL.

BUTORMIN

Analgésico inyectable a base de butorfanol



INDICACIONES

Analgesia pre, intra y postquirúrgico.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Butorfanol tartrato 1,02 g.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: Preanestesia: 0.1 a 0.2 mg/kg; Analgesia: 0.2 a 0.4 mg/kg EV (lento), IM o SC.
Gatos: Preanestesia: 0.1 a 0.2 mg/kg IM; Analgesia: 0.1 a

0.2 mg/kg EV (lento) o IM o 0.4 mg/kg SC.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hepatopatía severa, insuficiencia renal o cardíaca. No usar en gerontes ni en hembras preñadas.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla por 10ml.

CARDIAL

Vasodilatador mixto y protector cardíaco



INDICACIONES

Insuficiencia cardíaca en perros debido a insuficiencia valvular o cardiomiopatía dilatada.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Enalapril base (maleato) 5 mg., Espironolactona 5 mg.
Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 0,25 a 0,5 mg/kg, VO, cada 12 o 24 hrs de por vida.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en insuficiencia renal, hipotensión arterial, gestación, lactantes, cachorros.

PRESENTACIÓN

Estuches con 3 blísters de 10 comprimidos.

CARDIAL B

Vasodilatador mixto y protector cardíaco



INDICACIONES

Insuficiencia cardíaca en perros.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Benazepril base (clorhidrato) 2,5 mg/5mg/10 mg.,
Espironolactona 10 mg./20 mg./40mg.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Cardial B 2,5 mg: 1 comprimido cada 5 kg cada 24 hrs.
Cardial B 5 mg: 1 comprimido cada 10 kg cada 24 hrs.
Cardial B 10 mg: 1 comprimido cada 20 kg cada 24 hrs.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en insuficiencia renal, hipotensión arterial, gestación, lactantes, cachorros.

PRESENTACIÓN

Estuches con 2 blísters de 10 comprimidos cada uno.

CEFALEXINA 500

Antibiótico de amplio espectro



INDICACIONES

Tratamiento de infecciones producto de microorganismos sensibles a la cefalexina.



FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Cefalexina monohidrato 500 mg.
Excipientes c.s.

CONTRAINDICACIONES

Puede provocar náuseas, diarrea y malestar abdominal, vómitos.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 20-30 mg/kg, VO, cada 8-12 horas durante 7-10 días.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 5 o 30 blísters de 10 comprimidos cada uno.

CICLOSPORINA 1%

Ungüento oftálmico inmunomodulador



INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca y superficial crónica. Reduce cicatrices corneales. Queratitis. Conjuntivitis plasmocítica. Escleritis y epiescleritis.



FÓRMULA

Cada 100 g de ungüento contiene:
Ciclosporina A (USP) 1g.
Excipientes c.s.

CONTRAINDICACIONES

Infección ocular viral o fúngica. No usar en hembras gestantes ni en lactantes.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar 1 cm del ungüento cada 12 hrs. Administrar en la córnea o dentro del saco conjuntival y masajear sobre el párpado.

PRESENTACIÓN

Pomo conteniendo 3.5 g con aplicador oftálmico.

CLORHEXIDINA SPRAY

Solución antiséptica



INDICACIONES

Tratamiento de heridas y quemaduras. Antisepsia del campo quirúrgico. Desinfección de superficies e instrumental quirúrgico.



FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Digluconato de Clorhexidina 0,5 g.
Excipientes c.s.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar una o dos veces al día en la lesión, durante el tiempo que establezca el médico veterinario.

PRESENTACIÓN

Envases de 100 ml y 1 litro.

BIOCLIN GEL ANTIPLACA

Gel para el control y la prevención de la enfermedad periodontal



INDICACIONES

Halitosis. Periodontitis. Infecciones gingivales. Limpieza de dientes.

FÓRMULA

Cada 100 ml del gel contiene:
Digluconato de Clorhexidina 0,2 g.
Excipientes c.s.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la clorhexidina.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Colocar el gel anti-placa sobre el cepillo dental y cepillar con normalidad, 1 vez al día 2 veces por semana.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero de 20ml.



CLORHEXIDINA GOTAS OTICAS

Solución bactericida,
fungicida y ceruminolítica



INDICACIONES

En la prevención y el tratamiento de la otitis externa aguda y crónica ya sea de origen bacteriano, micótico o mixto.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Digluconato de Clorhexidina 0,5 g.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Administrar de 4 a 8 gotas en el conducto auditivo.
Masajear la base de la oreja y retirar el exceso con una

gasa estéril para cada conducto.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en ruptura de la membrana timpánica.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero con 15 ml.

COLIRAMA VIRAL

Colirio estéril



INDICACIONES

Oftalmodermias de etiología viral (queratitis y conjuntivitis herpética en gatos) y bacteriana en procesos inflamatorios asociados.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la suspensión contiene:
Idoxuridina 100 mg., Fenazona 400 mg., Clorhidrato de Nafazolina 50 mg.,
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: aplicar 1 gota en el saco conjuntival cada 4 hrs.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a alguno de los principios. Pacientes con glaucoma de ángulo estrecho o con predisposición al mismo.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero de 10 ml.

DERMOXIL

Shampoo de acción antiséptica y antiseborreica oleosa



INDICACIONES

Piodermas. Procesos seborreicos oleosos. Foliculitis. Impétigo. Acné felino. Coadyuvante en la demodicosis.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Peróxido de Benzoilo 2,5 g.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Mojar el manto, aplicar el shampoo y dejar actuar la espuma por 10 minutos y enjuagar.

CONTRAINDICACIONES

No presenta.

PRESENTACIÓN

Envase de 250 ml con cámara de aire para permitir su correcta agitación.

DIURENE 40

Diurético que actúa a nivel del asa y de los túbulos proximal y distal



INDICACIONES

Edema. Desequilibrios de electrolitos, como alto contenido de calcio y de potasio. Hipertensión.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Furosemida 40 mg.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 2 a 4 mg/kg cada 8 a 12 hrs.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes deshidratados o anúricos, desbalance electrolítico, enfermedad hepática. Preñez avanzada.

PRESENTACIÓN

Estuche con 3 blísteres por 10 comprimidos cada uno.

ECTHOL-AP

Antiparasitario externo



INDICACIONES

Control de pulgas, garrapatas y piojos en perros y ambientes.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Clorpirifos 7g. Cipermetrina 1 g.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: disolver 10 mL en 1 litro de agua. Empapar el cuerpo del animal con la solución y dejar secar naturalmente. Repetir cada 14 días. Ambientes: disolver 10 mL en

2 litros de agua

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en gatos, perros menores de 4 meses. Hembras preñadas y en período de lactancia.

PRESENTACIÓN

Frasco por 100 ml.

ECTHOL-GMP GATOS

Antiparasitario externo spot on. Pulguicida



INDICACIONES

Control y tratamiento de infestaciones por pulgas.

FÓRMULA

Cada 1 ml de la solución contiene:
Imidacloprid 100 mg. Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Gatos hasta 5 kg: 1 pipeta de 0.5 mL. Más de 5 kg: 1 pipeta de 0.75 mL.
Aplicar todo el contenido en el lomo del animal (entre escapulas). Repetir cada 4 semanas.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en gatos menores de 10 semanas de edad. Hipersensibilidad a su principio activo.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo una pipeta por 0.5 o 0.75 ml.

ECTHOL-GMP PERROS

Antiparasitario externo spot on.
Pulguicida y garrapaticida



INDICACIONES

Prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas y garrapatas.

FÓRMULA

Cada 1,5 ml de la solución contiene:
Imidacloprid 100 mg., Cifenotrina 400 mg.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Hasta 5 kg: 1 pipeta de 0.75 ml.
De 6 a 10 kg: 1 pipeta de 1,5 ml.
De 11 a 20 kg: 1 pipeta de 3 ml.
De 21 a 40 kg: 1 pipeta de 6 ml.
De 41 a 60 kg: 1 pipeta de 9 ml.

Aplicar todo el contenido en el lomo del animal (entre escapulas). Repetir cada 4 semanas.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar el producto en cachorros menores a 8 semanas de edad.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 1 pipeta por 0,75 – 1,5 – 3 – 6 y 9 ml.

ECTHOL COLLAR GATOS

Collar para el control de parásitos externos



INDICACIONES

Control de pulgas y garrapatas. Hasta 10 meses de duración.

FÓRMULA

Cada collar contiene:
Clorpirifós 10%

MODO DE EMPLEO

Gatos: collar de 40 cm de largo. Colocar a la medida del cuello de manera que pasen 2 dedos.

CONTRAINDICACIONES

Gatos menores de cuatro meses. No utilizar en hembras preñadas y en lactancia. Gatos de raza oriental.

PRESENTACIÓN

Caja con un collar de 40 cm.

ECTHOL COLLAR PERRO

Collar para el control de parásitos externos



INDICACIONES

Control de pulgas y garrapata. Hasta 10 meses de duración.

FÓRMULA

Cada collar contiene:
Clorpirifos 10%

MODO DE EMPLEO

Perros chicos: collar de 40 cm de largo.
Perros grandes: collar de 63 cm de largo.
Colocar a la medida del cuello de manera que pasen 2 dedos.

CONTRAINDICACIONES

Perros menores de cuatro meses. No utilizar en hembras preñadas y en lactancia. Animales enfermos, debilitados o sensibles que podrían presentar dermatitis de contacto.

PRESENTACIÓN

Caja con un collar de 40 cm o 63 cm.

EPITELIZANTE OCULAR OFTALDAY

Ungüento oftálmico
a base de Vitaminas A y E



INDICACIONES

Indicado en queratoconjuntivitis ulcerativas, como humectante ocular y estimulante de la actividad regenerativa de la córnea.

FÓRMULA

Cada 100 g de ungüento contiene:
Caseína hidrolizada 2,5 g., Vitamina A, palmitato 1 g.,
Vitamina E, Acetato 0,1 g., Excipientes c.s

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar 1 cm del ungüento sobre la córnea o dentro del saco conjuntival y masajear sobre el párpado. Repetir

cada 8 a 12 hrs durante 7 días.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad. No asociar con anestésicos locales.

PRESENTACIÓN

Pomo conteniendo 3.5 g, con aplicador oftálmico.

ENZIMAX

Suplemento dietario con enzimas proteolíticas de origen vegetal



INDICACIONES

Colabora en el proceso digestivo y ayuda a las dietas indicadas para trastornos gastrointestinales. Favorece la absorción de nutrientes.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Bromelina 32 mg, Papaina 1,6 mg, Betaina HCl 5 mg,
Excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros hasta 5 kg: ½ comprimido por día.
Perros hasta 10 kg: 1 comprimido por día.
Perros más de 10 kg: 2 comprimidos por día.
Gatos: ½ comprimido por día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 2 blísteres de 10 comprimidos birranurados.

FLURBIPROFENO OFTALDAY

Antiinflamatorio no esteroide



INDICACIONES

Procesos inflamatorios como conjuntivitis, uveítis leves y moderadas. Cirugías intraoculares.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Flurbiprofeno sódico 0,1 g.
Excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: aplicar 1 gota en el saco conjuntival cada 6 hrs.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en pacientes con glaucoma.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero por 5 ml, con aplicador atraumático.

FLOXADAY COMPRIMIDOS

Antibiótico de amplio espectro



INDICACIONES

Indicado en todo tipo de infecciones. Presenta actividad superior sobre microorganismos Gram negativos, Gram positivos, anaerobios e intracelulares.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Levofloxacina 100 mg, 200 mg y 400 mg según presentación. Excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 10 mg de levofloxacina por kg de peso, VO, cada 24 hrs.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las fluoroquinolonas. No administrar en hembras gestantes o en lactancia, ni en cachorros.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 1 blíster de 10 comprimidos.

FLOXADAY INYECTABLE

Antibiótico de amplio espectro



INDICACIONES

Indicado en todo tipo de infecciones. Presenta actividad superior sobre microorganismos Gram negativos, Gram positivos, anaerobios e intracelulares.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Levofloxacina 5 g.
Excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 7.5 mg de levofloxacina por kg de peso (1.5 ml cada 10 kg de peso) cada 24 horas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las fluoroquinolonas. No administrar en hembras gestantes o en lactancia, ni en cachorros.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla por 50 ml.

GRISEOFULVINA

Fungistático



INDICACIONES

Tiña. Dermatomicosis por *Microsporum canis*, *M. gypseum* y *Trichophyton mentagrophytes*.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Griseofulvina micronizada 250 mg y 500 mg según presentación. Excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 20-50 mg/kg de 4-6 semanas. En onicomicosis debe administrarse por 6-12 meses.

CONTRAINDICACIONES

No administrar durante la preñez.

PRESENTACIÓN

Envase con 2 blísteres de 10 comprimidos cada uno.

IQ 180

Biomodulador de la función neuronal



INDICACIONES

Síndrome senil, desorientación, cambios de personalidad. Prevención de la degeneración de los procesos cognitivos. Antioxidante. Regenerador celular.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Ácido Ascórbico, L-Glutamina, Nicotinamida, Ácido alfa lipoico, ATP, Excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros hasta 10 kg: 1/2 comprimido por día.
Perros de 10 a 30 kg: 1 comprimido por día.
Perros de más de 30 kg: 2 comprimidos por día.

Gatos: 1/4 a 1/2 comprimido por día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Caja con 3 blísteres de 7 comprimidos cada uno.

KETAMINA 50

Anestésico disociativo inyectable



INDICACIONES

Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Ketamina base (como clorhidrato) 5 g.
Excipientes c.s.

CONTRAINDICACIONES

Animales convulsivos, traumatismo craneano, glaucoma, insuficiencia cardíaca, renal y hepática, hipertensión

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla por 50 ml.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: EV: 7 a 10 mg/kg. IM: 15 a 25 mg/kg.
La combinación con otras drogas anestésicas puede reducir hasta un 50% la dosis de Ketamina.



KETAMID

Anestésico y tranquilizante inyectable



INDICACIONES

Premedicación, inducción y mantenimiento de anestesia.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Ketamina base (como clorhidrato), 5 g Midazolam base
(como clorhidrato) 0.2 g, Excipientes c.s.

CONTRAINDICACIONES

Hepatopatía severa. Insuficiencia renal y cardíaca.
Animales convulsivos. Traumatismo craneano. Hipertensión.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla por 50 ml.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: Ketamina 5 mg / kg - Midazolam 0,2 mg /
kg, EV lento o IM (1 ml cada 10kg de PV).



MV PERROS ARTICULAR

Dieta prescrita indicada en la prevención y tratamiento de problemas osteoarticulares



INDICACIONES

Tratamiento de patologías osteoarticulares y reparación de fracturas. Procesos articulares. En perros sanos con predisposición a padecer enfermedades articulares (preventivo). Colabora en mantener el peso ideal en adultos y cachorros con problemas osteoarticulares.

INGREDIENTES

Harina de subproductos de pollo, arroz, aceite de pollo, gluten de maíz, aceite de pescado (fuente de Omega 3), pulpa de remolacha, levadura de cerveza, aceite vegetal, hidrolizado proteico de pollo, extracto de Yucca schidigera, zeolita, inulina, condroitin sulfato, cúrcuma, glucosamina, carbonato de calcio, metilsulfonilmetano, óxido de cobre, óxido de zinc, sulfato ferroso, óxido de manganeso, selenito de sodio, cloruro de potasio, sal, vitaminas: A, D3, E, C, B1, B2, B6 y B12, pantotenato de calcio, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, cloruro de colina, BHA, BHT, taurina, extracto de romero, sorbato de potasio.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Humedad (máx) 10%
Proteína bruta (mín) 25%
Grasas (mín) 12%
Fibras (máx) 4%
Materia mineral (máx) 7%
Calcio (mín) 0,8% / (máx) 1,1%
Fósforo (mín) 0,6% / (máx) 0,8%
Relación Omega 3/Omega 6 1-4
Valor energético (kcal E.M. / kg tal cual) 3300..

MODO DE EMPLEO

Suministrar de acuerdo a criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 2 y 10 kg.



MV PERROS CARDIO

Dieta prescrita indicada en perros que padecen hipertensión arterial o alguna cardiopatía



INDICACIONES

Tratamiento de patologías cardíacas. Hipertensión arterial secundaria a: Hipotiroidismo (arterioesclerosis y rigidez de vasos sanguíneos), hipertiroidismo, Cushing, entre otras.

INGREDIENTES

Harina de subproductos de pollo, arroz, gluten de maíz, aceite de pollo, pulpa de remolacha, cáscara de soja, levadura de cerveza, aceite vegetal, hidrolizado proteico de pollo, aceite de pescado, zeolita, inulina, L-carnitina, taurina, carbonato de calcio, óxido de cobre, óxido de zinc, sulfato ferroso, óxido de manganeso, selenito de sodio, cloruro de potasio, vitaminas: A, D3, E, C, B1, B2, B6 y B12, pantotenato de calcio, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, extracto de Yucca schidigera, extracto de té verde, cloruro de colina, L-carnitina, taurina, BHA, BHT, extracto de romero, sorbato de potasio.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Humedad (máx) 10%
Proteína bruta (mín) 24%
Grasas (mín) 12%
Fibras (máx) 5%
Materia mineral (máx) 7%
Calcio (mín) 0,6% / (máx) 1%
Fósforo (mín) 0,4% / (máx) 0,65%
Sodio (máx) 0,08%
L-carnitina 0,05%
Taurina 0,2%
Relación Omega 3/Omega 6 1-4
Valor energético (kcal E.M. / kg tal cual) 3200.

MODO DE EMPLEO

Suministrar de acuerdo a criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 2 y 10 kg.



MV PERROS GASTROINTESTINAL

Dieta prescrita para perros con enfermedades gastrointestinales



INDICACIONES

Tratamiento de problemas y trastornos digestivos. Alta digestibilidad, energía y bajo residuo. Tratamiento de patologías gastrointestinales. Intolerancias alimentarias.

INGREDIENTES

Harina de subproductos de pollo, arroz, tapioca, aceite de pescado (fuente de Omega 3), pulpa de remolacha, aceite de pollo, aceite de girasol, aceite de coco, levadura de cerveza, hidrolizado proteico de pollo, plasma bovino, zeolita, inulina, extracto de Yucca schidigera, extracto seco de alcachofa, glutamina, butirato de sodio, carbonato de calcio, óxido de cobre, óxido de zinc, sulfato ferroso, óxido de manganeso, selenito de sodio, cloruro de potasio, sal, vitaminas: A, D3, E, C, B1, B2, B6 y B12, pantotenato de calcio, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, cloruro de colina, BHA, BHT, extracto de romero, sorbato de potasio.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Humedad (máx) 10%
Proteína bruta (mín) 28%
Grasas (mín) 13%
Fibras (máx) 3%
Materia mineral (máx) 7%
Calcio (mín) 0,9% / (máx) 1,3%
Fósforo (mín) 0,8% / (máx) 1,3%
Sodio (máx) 0,08%
Relación Omega 3/Omega 6 1-4
Valor energético (kcal E.M. / kg tal cual) 3700

MODO DE EMPLEO

Suministrar de acuerdo a criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 2 y 10 kg.



MV PERROS OBESIDAD

Dieta prescrita para perros obesos o con tendencia al sobrepeso



INDICACIONES

Tratamiento de Obesidad. Hiperlipidemia. En perros con predisposición a padecer sobrepeso. Animales castrados. Como coadyuvante en el manejo dietario de pacientes diabéticos.

INGREDIENTES

Harina de subproductos de pollo, sebo de pollo, albúmina, aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo, ácido linoleico conjugado, arroz, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, extracto de Yucca schidigera, celulosa en polvo, extracto de Garcinia cambogia, cáscara de soja, zeolita, sal, calcio, fósforo, potasio, sodio, azufre, hierro, manganeso, cobre, zinc, yodo, cobalto, selenio. Vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, taurina, BHA-BHT, TBHQ, ácido cítrico, ácido propiónico y sus sales (dipropionato de amonio), carnitina, extracto de romero.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Proteína bruta (mín.) 28 %
Extracto etéreo (mín.) 7 %
Fibra cruda (máx.) 4,5 %
Minerales totales (máx.) 8%
Humedad (máx.) 10%
Calcio (mín.) 0,6 % (máx.) 1,2 %
Fósforo (mín.) 0,5 % (máx.) 1%
Valor energético (kcal E.M. / kg tal cual) 3000.

MODO DE EMPLEO

Suministrar de acuerdo a criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 2 y 10 kg.



MV PERROS RENAL

Dieta Prescripta para perros adultos y gerontes
que padecen enfermedad renal crónica



INDICACIONES

Tratamiento de patologías renales por lesiones anatómicas o funcionales.
Favorece la función cardíaca y mantiene la masa muscular. Encefalopatía hepática.

INGREDIENTES

Arroz, harina de subproductos de pollo, aceite de pollo, gluten de maíz, aceite de pescado (fuente de Omega 3), pulpa de remolacha, huevo en polvo, cáscara de soja, hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza, zeolita, extracto de Yucca schidigera, apio deshidratado en polvo, inulina, polvo de marigold, carbonato de calcio, óxido de cobre, óxido de zinc, sulfato ferroso, óxido de manganeso, selenito de sodio, cloruro de potasio, vitaminas: A, D3, E, C, B1, B2, B6 y B12, pantotenato de calcio, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, cloruro de colina, bicarbonato de sodio, BHA, BHT, extracto de romero, sorbato de potasio.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Humedad (máx) 10%
Proteína bruta (mín) 16%
Grasas (mín) 14%
Fibras (máx) 3%
Materia mineral (máx) 7%
Calcio (mín) 0,45% / (máx) 0,6%
Fósforo (mín) 0,15% / (máx) 0,25%
Sodio (máx) 0,27% Relación Omega 3/Omega 6 1-4
Valor energético (kcal E.M. / kg tal cual) 3600

MODO DE EMPLEO

Suministrar de acuerdo a criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 2 y 10 kg.



MV PERROS SENSIBILIDAD DIETARIA

Dieta prescripta indicada en dermatitis
alérgicas e intolerancias alimentarias



INDICACIONES

Tratamiento de patologías dérmicas. Intolerancia alimentaria. Para mantener piel saludable y manto brillante. En perros sanos con predisposición genética a padecer dermatitis alérgicas.

INGREDIENTES

Arroz, almidón de maíz y mandioca, harina de pescado, hidrolizado proteico de pollo, aceite de pollo, albúmina de huevo, aceite de pescado (fuente de Omega 3), levadura de cerveza, pulpa de remolacha, aceite vegetal, cáscara de soja, zeolita, sal, betaína HCL, pantotenato de calcio, fósforo, cloruro de potasio, azufre, sulfato ferroso, óxido de manganeso, óxido de cobre, gluconato de zinc, yodo, cobalto, selenio. Vitaminas: A, D3, E, C, B1, B2, B6 y B12, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, taurina, BHA-BHT, ácido propiónico y sus sales, extracto de romero.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Humedad (máx) 10%
Proteína bruta (mín) 23%
Grasas (mín) 12%
Fibras (máx) 4%
Materia mineral (máx) 8%
Calcio (mín) 0,6% / (máx) 1,2%
Fósforo (mín) 0,5% / (máx) 1%
Relación Omega 3/Omega 6 1-4
Valor energético (kcal E.M. / kg tal cual) 3200

MODO DE EMPLEO

Suministrar de acuerdo a criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 2 y 10 kg.



MV GATOS GASTROINTESTINAL

Dieta prescrita para gatos con enfermedades gastrointestinales



INDICACIONES

Problemas y trastornos digestivos. Intolerancias alimentarias. Convalecencia.

INGREDIENTES

Harina de subproductos de pollo, huevo en polvo de gallina, albúmina, sebo de pollo, aceite de pescado, hidrolizado proteico de pollo, arroz, almidón de mandioca, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, extracto de Yucca schidigera, aceite de girasol, extracto de alcachofa, cúrcuma, zeolita, sal, bicarbonato de sodio, metionina, calcio, fósforo, potasio, sodio, azufre, hierro, manganeso, cobre, zinc, yodo, cobalto, selenio. Vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, cloruro de colina. C, D3, E, Taurina, glutamina, prolina, BHA-BHT-TBHQ-ácido cítrico, acidificante urinario (bisulfato de sodio), butirato de sodio, ácido propiónico, dipropionato de amonio, extracto de romero.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Proteína bruta (min.) 32%
Extracto etéreo (min.) 20%
Fibra cruda (máx.) 2.5%
Minerales totales (máx.) 7%
Humedad (máx.) 10%
Calcio (min.) 0.6% - (máx) 0.8 %
Fósforo (min.) 0.5% - (máx) 0.7%
Valor energético (kcal E.M. / kg tal cual) 3925

MODO DE EMPLEO

Suministrar de acuerdo a criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 2 kg.



MV GATOS OBESIDAD

Dieta prescrita para gatos obesos o con tendencia al sobrepeso



INDICACIONES

Tratamiento de Obesidad. Hiperlipidemia. En gatos con predisposición a padecer sobrepeso. Gatos castrados. Como coadyuvante en el manejo dietario de pacientes diabéticos.

INGREDIENTES

Harina de subproductos de pollo, gluten meal, arroz, harina de pescado, aceite de pollo, hidrolizado proteico de pollo, plasma bovino desecado, pulpa de remolacha, cáscara de soja, aceite de pescado (fuente de Omega 3), aceite vegetal, levadura de cerveza, celulosa en polvo, sal, zeolita, inulina, extracto de, bisulfato de sodio, taurina, DL metionina, carnitina, garcinia cambogia, ácido linoleico conjugado, óxido de cobre, óxido de zinc, sulfato ferroso, óxido de manganeso, cloruro de potasio, vitaminas: A, D3, E, C, B1, B2, B6 y B12, pantotenato de calcio, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, cloruro de colina, sorbato de potasio, BHA, BHT, extracto de yuca, extracto de romero.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Humedad (máx) 10%
Proteína bruta (mín) 38%
Grasas (mín) 9%
Fibras (máx) 5%
Materia mineral (máx) 7%
Calcio (mín) 0.8% / (máx) 0.9%
Fósforo (mín) 0.7% / (máx) 0.85%
Carnitina 500 ppm
Relación Omega 3/Omega 6...1-4
Valor energético (kcal E.M. / kg tal cual) 3170.

MODO DE EMPLEO

Suministrar de acuerdo a criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 2 kg.



MV GATOS RENAL

Dieta prescrita para gatos que padecen enfermedad renal crónica.



INDICACIONES

Tratamiento de patologías renales por lesiones anatómicas o funcionales. Encefalopatía hepática.

INGREDIENTES

Arroz, harina de subproductos de pollo, huevo en polvo, almidón de maíz, aceite de pollo, gluten meal, pulpa de remolacha, aceite de pescado (fuente de Omega 3), hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza, aceite vegetal, celulosa en polvo, cáscara de soja, bisulfato de sodio, sal, zeolita, metionina, extracto de Yuca schidigera, apio deshidratado en polvo, L-lisina, pantotenato de calcio, fósforo, cloruro potasio, azufre, sulfato ferroso, óxido de manganeso, óxido de cobre, óxido de zinc, yodo, cobalto, selenio. Vitaminas: A, D3, E, C, B1, B2, B6 y B12, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, taurina, BHA-BHT, ácido propiónico y sus sales, extracto de romero, arginina.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Humedad (máx) 10%
Proteína bruta (mín) 24%
Grasas (mín) 22%
Fibras (máx) 4%
Materia mineral (máx) 6%
Calcio (mín) 0,5% / (máx) 0,7%
Fósforo (mín) 0,25% / (máx) 0,4%
Magnesio (máx) 0,07%
Relación Omega 3/Omega 6 1-4
Valor energético (kcal E.M. / kg tal cual) 3900

MODO DE EMPLEO

Suministrar de acuerdo a criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 2 kg.



MV GATOS URINARIO

Dieta prescrita para gatos con enfermedad de vías urinarias bajas



INDICACIONES

FLUTD. Cistitis. Infecciones urinarias. Esta fórmula está indicada para prevenir la formación de cristales de estruvita o de oxalato de calcio ante factores predisponentes.

INGREDIENTES

Harina de subproductos de pollo, gluten meal, arroz, aceite de pollo, maíz, hidrolizado proteico de pollo, plasma bovino desecado, pulpa de remolacha, aceite de pescado (fuente de Omega 3), aceite vegetal, levadura de cerveza, celulosa en polvo, extracto de manzanilla, sal, zeolita, inulina, bisulfato de sodio, taurina, extracto de yuca, DL-metionina, óxido de cobre, óxido de zinc, sulfato ferroso, óxido de manganeso, cloruro de potasio, condroitin sulfato, vitaminas: A, D3, E, C, B1, B2, B6 y B12, pantotenato de calcio, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, cloruro de colina, sorbato de potasio, BHA, BHT, extracto de romero, sorbato de potasio.

ANÁLISIS NUTRICIONAL

Humedad (máx) 10%
Proteína bruta (mín) 35%
Grasas (mín) 17%
Fibras (máx) 4%
Materia mineral (máx) 6%
Calcio (mín) 0,7% / (máx) 0,8%
Fósforo (mín) 0,6% / (máx) 0,7%
Relación Omega 3/Omega 6 1-4
Valor energético (kcal E.M. / kg tal cual) 3900

MODO DE EMPLEO

Suministrar de acuerdo a criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 2 kg y 7,5 kg.



NOMAT

Biomodulador detoxificante y antioxidante a base de clorofila



INDICACIONES

Disminuye la halitosis y el mal olor corporal. En hembras elimina el olor estral y desodoriza la orina. Mejora la inflamación de la cavidad oral.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Clorofila cuprosódica 75 mg.
Excipientes c.s.

Perras en celo: duplicar la dosis.

CONTRAINDICACIONES

No presenta.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros hasta 10 kg: 1 comprimido cada 24 horas.
Perros >10 kg: 1 comprimido cada 12 horas.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 2 blísteres con 10 comprimidos cada uno.

OFLOXACINA OFTALDAY

Antibiótico oftálmico



INDICACIONES

Conjuntivitis infecciosa, úlceras de córnea, pre y postquirúrgico de intervenciones oftálmicas. Actúa contra bacterias Gram (+) y Gram (-), incluyendo anaeróbicos, micoplasmas y clamidias.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Ofloxacin 0,3 g.
Excipientes c.s.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a Ofloxacin.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero por 5 ml, con aplicador atraumático.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar 1 gota en el saco conjuntival cada 12 hrs durante 7 días.

OHM

Suplemento dietario modulador de la ansiedad



INDICACIONES

Indicado para situaciones que generen un aumento en los niveles de estrés y ansiedad.

FÓRMULA

Cada comprimido de 1500 mg. contiene:
Tryptófano 200 mg., Extracto de Valeriana 100 mg.,
Excipientes c.s.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales menores a 8 semanas, ni en gestantes o en lactancia.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 3 blísteres de 7 comprimidos cada uno.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Gatos o perros de 5 kilos o menos: ½ comprimido.
Perros de 5 a 10 kilos: 1 comprimido.
Perros de más de 10 kilos: 2 comprimidos.

OHM jeringa

Suplemento dietario modulador de la ansiedad



INDICACIONES

Indicado para situaciones que generen un aumento en los niveles de estrés y ansiedad.

FÓRMULA

Cada 1 g de pasta palatable:
Tryptófano 100 mg, Extracto de raíz de Valeriana 50 mg,
Teaína 7,5 mg, Excipientes c.s.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales menores a 8 semanas, ni en gestantes o en lactancia.

PRESENTACIÓN

1 jeringa dosificadora conteniendo 7 g.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

1 dosis diaria por animal (1gr/día).

OL TRANS FLEX

Coadyuvante osteoarticular



INDICACIONES

Suplemento nutricional indicado para conservar la salud articular.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Glucosamina Sulfato, Metilsulfonilmetano (MSM), Ácido
Ascórbico, Manganese Gluconato, Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 1 comprimido cada 20 cada 24 horas. No menos
de 4-6 semanas.

CONTRAINDICACIONES

No presenta.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 3 y 10 blísteres por 7 comprimidos
cada uno.

PILERAN GOTAS

Antiemético gastrocinético



INDICACIONES

Tratamiento del vómito de diversas etiologías, esofagitis por reflujo, náuseas y trastornos de la motilidad
gástrica. Preparación para estudios radiológicos del tubo digestivo y para cirugías.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Metoclopramida clorhidrato 0,5 g.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 0,5 mg/kg cada 6-8 horas (2 gotas/1 kg)

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en presencia de cuerpos extraños.
Cuadros convulsivos. Preñez temprana. Lactancia.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero conteniendo 20 ml.

PILERAN INYECTABLE

Antiemético gastrocinético



INDICACIONES

Tratamiento del vómito de diversas etiologías, esofagitis por reflujo, náuseas y trastornos de la motilidad
gástrica. Preparación para estudios radiológicos del tubo digestivo.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Metoclopramida clorhidrato 0,5 g.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 0,5 mg/kg de peso vivo cada 8 horas, EV
lenta, IM o SC.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en presencia de cuerpos extraños.
Cuadros convulsivos. Preñez temprana. Lactancia.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla conteniendo 50 ml.

PIMOCARD

Inotrópico positivo y vasodilatador periférico



INDICACIONES

Insuficiencia cardíaca congestiva tipo C en perros. Aumenta la fuerza de contracción cardíaca. Reduce
la resistencia vascular generando vasodilatación.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Pimobendan 1.25 mg, 2.5mg, 5mg y 10 mg según present-
ación. Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 0,2 y 0,6 mg por kg de peso cada 24 hrs.

CONTRAINDICACIONES

Cardiomiopatía hipertrófica. No utilizar en perros con
insuficiencia hepática grave ni en cachorros.

PRESENTACIÓN

Estuches con 2 blísteres de 10 comprimidos cada uno.

POTENPET JERINGA

Biomodulador revitalizante y energizante



INDICACIONES

Complemento dietario a base de vitaminas, aminoácidos y antioxidantes indicado para gatos adultos que necesitan suplementar su dieta.

FÓRMULA

Cada 1 g de pasta palatable:
Metionina DL, Taurina, Nicotinamida, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B2 base 1,0 mg, Vitamina B12, Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

1 dosis diaria por animal (1gr/día).

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

PRESENTACIÓN

1 jeringa dosificadora conteniendo 7 g.

POTENPET

Biomodulador revitalizante



INDICACIONES

Recuperación de animales convalecientes y en estados carenciales.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Metionina, Ácido Ascórbico, Nicotinamida, Gluconato de zinc, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B12, Ácido Fólico, Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros hasta 10 kg: 1/2 comprimido por día.
Perros de 10 a 30 kg: 1 comprimido por día.

Perros de más de 30 kg: 2 comprimido por día.
Gatos: 1/4 a 1/2 comprimido por día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes.

PRESENTACIÓN

Caja con 3 blísteres de 7 comprimidos cada uno.

PREDNISOLONA

Glucocorticoide sintético no fluorado



INDICACIONES

Procesos inflamatorios y alérgicos. Enfermedades autoinmunes. Coadyuvante en la terapia antineoplásica y de sustitución. Inmunosupresor.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Prednisolona 20 mg
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 0,25 mg/kg/día.
Enfermedad autoinmune: 2-4 mg/kg/día.
Procesos inflamatorios: 0,5-1 mg/kg/día.

CONTRAINDICACIONES

Enfermedades infecciosas bacterianas, virales y micóticas. Úlceras gastrointestinales. Preñez y lactancia.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 1 blíster con 10 comprimidos.

PROTELIV GOTAS

Hepatoprotector



INDICACIONES

Insuficiencia hepatobiliar, hepatitis agudas y crónicas, colecistitis, colangitis.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Colina Bitartrato, Alcachofa extracto, Nicotinamida, Ácido Dehidrocólico, Ácido Desoxicólico, Metilbromuro de Homatropina, Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y Gatos: 10-20 gotas cada 12 horas.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia hepatocelular grave. Obstrucción de las vías biliares. Íleo paralítico.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero con 15 ml.

PROTELIV COMPRIMIDOS

Hepatoprotector



INDICACIONES

Enfermedades hepáticas agudas o crónicas. Animales con elevados índices de enzimas hepáticas, con o sin signos clínicos. En tratamientos prolongados con fármacos de alta metabolización hepática, o que presenten potencial hepatotoxicidad.

FÓRMULA

Cada comprimido de 1500 mg contiene:
Ácido alfalipoico, Silybum marianum, Cynara scolymus, Cúrcuma longa, Betaína clorhidrato, Metionina, Colina Bitartrato, Zinc Gluconato, N-acetil cisteína, Vitamina B12, Excipiente c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Cada 24hrs. Gatos: 1/4 a 1/2 comprimido.

Perros hasta 5 kg: 1/2 comp. Hasta 10 kg: 1 comp.
Más de 10 kg: 2 comprimidos.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en caso de obstrucción de vías biliares.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 3 blísteres de 7 comprimidos.

PROTELIV JERINGA GATOS

Hepatoprotector



INDICACIONES

Enfermedades hepáticas agudas o crónicas.

FÓRMULA

Cada 1 g contiene:
Ácido ursodesoxicólico, N-Acetilcisteína, Extracto en polvo de Cardo Mariano, Colina, Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

1 dosis diaria por animal (1gr/día).

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con obstrucción de conductos biliares.

PRESENTACIÓN

Jeringa de 7 gramos.

RELAY C COMPRIMIDOS

Antiprolactínico no hormonal



INDICACIONES

Tratamiento de la pseudopreñez. Supresión de la secreción láctea. Síndrome de Cushing hipofisario. Sincronización de celo.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Cabergolina 100 mcg.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perras: 5 mcg/kg cada 24 hrs durante 4 a 6 días.
Gatas: 2,5 a 5 mcg/kg cada 24 hrs durante 4 a 6 días.
Síndrome de Cushing: 70 mcg/kg por semana (cada 48 hrs).

CONTRAINDICACIONES

Preñez. Enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática.

PRESENTACIÓN

Envase con 1 blíster por 10 comprimidos.

SISTEMA ENDECTOCIDA

Endectocida a base de ivermectina



INDICACIONES

Parasitosis externas: demodicosis felina, sarna notoédrica, sarna otodéctica y cheyletielosis. Parasitosis internas: Ascaris sp y Ancylostoma sp. garrapatas.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Ivermectina 5 mg.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Cheyletielosis: 0,3 mg/kg VO, 2-3 dosis.
Sarna notoédrica y otodéctica: 0,3 mg/kg VO, 2 dosis.
Demodicosis felina: 0,3 mg/kg VO.
Ascariasis y Ancylostomiasis: 0,3 mg/kg VO, 2 dosis.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la ivermectina. Cachorros menores a 6 semanas. Razas sensibles a la ivermectina.

PRESENTACIÓN

Estuche con 6 blísteres de 10 comprimidos.

SOLUBRON 20

Mucolítico expectorante



INDICACIONES

Rinotraqueítis, traqueobronquitis, bronquitis aguda y crónica, bronquiectasias y bronconeumonías.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Bromhexina 20 mg.
excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 1 mg/kg. Duración según criterio del médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES

Preñez. Precaución en pacientes con úlcera gástrica, diabetes mellitus.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 3 blísteres de 10 comprimidos cada uno.

TONIPET COMPRIMIDOS

Cardioprotector



INDICACIONES

Suplemento coadyuvante para el tratamiento de cardiopatías. Animales con predisposición a padecer enfermedades cardiovasculares.

FÓRMULA

Cada comprimido de 1500 mg contiene:
Taurina, Gluconato de Mg., Vit. E, Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12,
Vit. B2, Coenzima Q10, Excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros hasta 10 kg: 1/2 comprimido por día.
Perros de 10 a 30 kg: 1 comprimido por día.

Perros de más de 30 kg: 2 comprimido por día.
Gatos: 1/4 a 1/2 comprimido por día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Caja con 3 blísteres de 7 comprimidos cada uno.

TORACARD

Diurético de asa



INDICACIONES

Perros con signos clínicos de edema y efusión, relacionados con la insuficiencia cardíaca congestiva canina (ICC). En pacientes con hipertensión.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Torasemida 0.6 g., Excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Casos leves: 0,2 mg/kg.
Casos moderados a graves: 0,4 mg/kg.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia renal, deshidratación, hipotensión arterial.
Gestación y lactancia.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero por 5 ml y 10 ml.

TOTAL FULL CG

Antiparasitario interno de amplio espectro



INDICACIONES

Tratamiento contra coccidios (*Isospora* spp); protozoos (*Giardia* spp) y Nematodos (*Toxocara* spp - *Toxascaris* spp - *Ancylostoma* spp - *Trichuris* spp).

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Fenbendazol 5 g., Toltrazuril 2 g.
Excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y Gatos: 1 ml / kg.
Coccidios: dos tomas, intervalo de 7 días.
Giardias y nematodos: una toma cada 24 hrs, tres días

consecutivos. En Ascaris y Ancylostoma repetir entre 14 y 21 días, para Trichuris repetir a los 30 y 60 días.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a cachorros menores de 20 días de vida.
Preñez

PRESENTACIÓN

Frasco por 15 y 150 ml con jeringa dosificadora.

TOTAL FULL LC GATOS

Antiparasitario interno de amplio espectro



INDICACIONES

Prevención y tratamiento de cestodos, nematodos.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Fenbendazol 200 mg., Pirantel 80 mg., Praziquantel 20 mg.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Gatos: 1 comprimido cada 4 kg, VO. Una toma única.

CONTRAINDICACIONES

Gatitos de menos de 20 días. Gatas preñadas hasta los 41 días.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 1 blíster con 2 comprimidos.



TOTAL FULL GATOS SUSPENSIÓN

Antiparasitario interno
de amplio espectro



INDICACIONES

Infestaciones por cestodos (*Dipylidium caninum*), nematodos (*Toxocara cati*, *Toxascaris leonina* y *Ancylostoma* sp.).

FÓRMULA

Cada 100 ml de la suspensión contiene:
Fenbendazol 5 g., Pirantel base 2 g., Praziquantel 0,5 g.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Gatos: 1 ml/kg de peso vivo en una sola toma.

CONTRAINDICACIONES

Gatitos de menos de 20 días. Gatas preñadas hasta los 41 días.

PRESENTACIÓN

Frasco conteniendo 15 ml con jeringa dosificadora.



TOTAL FULL LC PERROS

Antiparasitario interno de amplio espectro



INDICACIONES

Prevención y tratamiento de cestodos (*Dipylidium caninum*, *Taenia* sp.), nematodos (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*) y giardias.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Fenbendazol, Pirantel base, Praziquantel.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Cestodos y Nematodos: 1 comprimido cada 5 kg, 10kg o 20 kg de peso vivo (según presentación). Única toma.
Ante infecciones severas repetir la dosis a las 24 hrs.

CONTRAINDICACIONES

No usar en hembras preñadas antes del día 41 de gestación y en cachorros antes de los 20 días de vida.

PRESENTACIÓN

Envase con 1 blíster por 2 comp. para perros hasta 10 kg y 20 kg.
Envase con 1 blíster por 3 comp. para perros hasta 60 kg.



VIVIRAM-V

Analéptico estimulante cardio-respiratorio



INDICACIONES

En animales con depresión ventilatoria por barbitúricos, buprenorfina, xilacina y agentes inhalados. Acelera la recuperación post anestésica. Estimula la respiración en neonatos deprimidos.

FÓRMULA

Cada 100 ml de la solución contiene:
Doxapram clorhidrato 2 g.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 1 mg/kg. EV. Barbitúricos, xilacina y buprenorfina: 5 a 10 mg/kg EV.
Neonatos: 1 a 2 gotas de la solución inyectable sublingual, se puede repetir cada 15 a 20 minutos.

CONTRAINDICACIONES

No usar en hembras gestantes. No administrar más de 2 veces con un intervalo de 15-20 minutos. Para la administración las vías respiratorias del animal no deben estar obstruidas.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla por 10 ml.





Efectivo contra chatos,
redondos, giardias y coccidios



TOTALFULLCG

Único antiparasitario interno con liberación controlada

Eficacia
comprobada

MÁS DEL
98%

- ✓ Comprimidos saborizados y ranurados
- ✓ Fácil administración en 1 sola dosis

Conozca la línea completa del
antiparasitario más práctico

**TOTAL
FULLCG**

**TOTAL
FULLCG
SUSPENSIÓN**

