LISAN

COSTA RICA

BROMHEXINA

Mucolítico y expectorante

INDICACIONES
Tratamiento de trastornos respiratorios asociados con mucosidad viscosa o excesiva.

FÓRMULA
Cada 5 mL de solución contiene:
Bromhexina HCl 4mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros y gatos: 5 ml por cada 4 kg, dos veces al día, por 5 a 7 días.

CONTRAINDICACIONES
Administrar con precaución en animales con gastritis o úlcera gástrica.

PRESENTACIÓN
Frasco de 60 y 120 mL.

CALCIO CON FÓSFORO Y VITAMINAS B12 Y D3

Suplemento nutricional

INDICACIONES
Indicado para estados carenciales o desbalance de calcio, fósforo, vitaminas B12 y D3 (raquitismo, osteoporosis etc), también como suplemento en hembras durante la lactancia.

FÓRMULA
Cada 100 mL contiene:
Fósforo, calcio, vitaminas B12 y D3
Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros adultos: 10 - 15 mL por día.
Cachorros y gatos: 3 - 10 mL por día.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

PRESENTACIÓN
Frasco de 173 mL.

CICATRIZANTE NATURAL

Cicatrizante

INDICACIONES
Cicatrizante con ingredientes naturales con acción emoliente y repelente de insectos para diferentes aplicaciones.

FÓRMULA
Cada 100g contiene:
Aceite de Melaleuca alternifolia 4g
Extracto de sábila 5g

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Aplicar sobre la herida de 2 a 3 veces al día hasta completa recuperación.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

PRESENTACIÓN
Tubo de 35 g.

CLOTRIMAZOL BN

Fungicida, antiinflamatorio, bactericida

INDICACIONES
Tratamiento de afecciones cutáneas y/o mucocutáneas causadas por hongos y/o bacterias.

FÓRMULA
Cada 100 g contiene:
Clotrimazol 10 mg, Sulfato de neomicina 5 mg, Betametasona (Dipropionato) 0.5 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Aplicar sobre el área afectada 2 veces al día durante 15 días mínimo.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

PRESENTACIÓN
Tubo de 35 g.

CIPROFLOXACINA

Antibiótico

INDICACIONES
Infecciones respiratorias, óticas, nasales, oculares, gastrointestinales, urogenitales, osteoarticulares.

FÓRMULA
Cada tableta contiene:
Ciprofloxacina 50 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros y gatos: 5 - 15 mg por kg de peso, cada 12 horas durante 5 a 7 días.

CONTRAINDICACIONES
No administrar a hembras gestantes, lactantes, ni a perros o gatos menores de ocho meses.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo 10 tabletas de 50 y 250 mg.

DOXICLIN-LISAN

Antibiótico

INDICACIONES
Tratamiento de enfermedades del sistema respiratorio, urogenital y en casos de colangitis, mastitis, prostatitis y piodermatitis.

FÓRMULA
Cada tableta contiene:
Doxiciclina (Hiclato) 300 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros: 10 mg por kg cada 12 horas.
Infecciones susceptibles: 5 mg por kg cada 12 horas.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en pacientes con enfermedad hepática severa, No administrar en hembras gestantes ni en animales menores de 8 semanas.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo 60 tabletas de 300mg.

FENILBUTAZONA

Ungüento-Analgésico-Antiinflamatorio

INDICACIONES
Alivio de lesiones a nivel muscular o articular, ocasionadas por golpes, torceduras u otro tipo de trauma.

FÓRMULA
Cada 100 gramos contienen:
Fenilbutazona 3 g
Salicilato de Metilo 10 g

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros: Aplicar sobre la superficie afectada 3 veces al día hasta que desaparezca
la inflamación.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en gatos. No aplicar en heridas o úlceras cutáneas.

PRESENTACIÓN
Tubo de 90 g

FLUCONAZOL

Antimicótico

INDICACIONES
Antimicótico de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades fúngicas que afectan a perros y gatos, tales como Dermatitis por Malassezia, Dermatomicosis, Criptococosis, Candidiasis, etc.

FÓRMULA
Cada tableta contiene:
Fluconazol 200 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Malassezia: 5 - 10 mg por kg, cada 24 hrs por 4 a 8 semanas.
Candidiasis, Criptococosis y Micosis sistémica: 2.5 - 5 mg por kg cada 24 hrs durante 60-80 días.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en animales preñados ni durante la lactancia y en pacientes con deterioro de la función hepática.

PRESENTACIÓN
Caja por 10 tabletas.

KETOCONAZOL

Antimicótico

INDICACIONES
Infecciones de la piel que no responden a terapia local.

FÓRMULA
Cada tableta contiene:
Ketoconazol 200 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros: 5 - 20 mg por kg 1 vez al día. De 1 a 8 semanas.
Gatos: 5 - 10 mg por kg 1 vez al día.
Micosis sistémicas: ampliar el tratamiento hasta por 3 meses.

CONTRAINDICACIONES
Utilizar con precaución en hembras gestantes y en animales con enfermedad hepática.

PRESENTACIÓN
Caja por 10 tabletas.

LOPE LISAN

Antidiarreico

INDICACIONES
Tratamiento de diarreas agudas de etiología bacteriana, dietética o inflamatoria.

FÓRMULA
Cada 100 mL contienen:
Trimetoprima, Sulfametoxazol, Caolín, Pectina, Sulfato de Neomicina, Loperamida HCl.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros y gatos: 1-2 mL por kg cada 12 horas por 4 días mínimo.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en animales con afección hepática y/o renal.
Utilizar con precaución en hembras gestantes.

PRESENTACIÓN
Frasco de 100 mL

METOCLOPRAMIDA

Regulador de la motilidad gastrointestinal

INDICACIONES
Control del vómito, el meteorismo y las náuseas.

FÓRMULA
Cada mL contiene:
Metoclopramida base (en forma de Clorhidrato) 4.6 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros y gatos: 2 gotas por kg, 3 veces al día durante 3 a 5 días.

CONTRAINDICACIONES
Hemorragia del tracto digestivo, perforación gastrointestinal, obstrucción del tracto digestivo.

PRESENTACIÓN
Frasco gotero de 30 mL

METRONIDAZOL SUSPENSIÓN

Antiparasitario-Bactericida

INDICACIONES
Indicado para el control y tratamiento de las infecciones producidas por Giardia, Trichomonas en perros y gatos, así como infecciones anaeróbicas entéricas y sistémicas.

FÓRMULA
Cada 5 mL contiene:
Metronidazol (en forma de Benzoato) 125 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros y gatos: Giardias, 1 mL por kg de peso dos veces al día durante 7 a 8 días.

CONTRAINDICACIONES
No se debe administrar en hembras en estado de gestación o durante el período de lactancia.

PRESENTACIÓN
Frasco de 60 mL

Droguería e Importadora Alemana

Lisan

METRONIDAZOL 500MG

Antiparasitario-Bactericida

INDICACIONES
Indicado para el control y tratamiento de las infecciones producidas por Giardia, Trichomonas en perros y gatos, así como infecciones anaeróbicas entéricas y sistémicas.

FÓRMULA
Cada tableta contiene:
Metronidazol 500 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros y gatos: 25 mg por kg cada 12 horas durante 8 días.

CONTRAINDICACIONES
No se debe administrar en hembras en estado de gestación o durante el periodo de lactancia

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo 20 tabletas de 500mg.

OVISTOP

Desparasitante de amplio espectro

INDICACIONES
Desparasitante de amplio espectro contra los helmintos comunes en perros y gatos.

FÓRMULA
Cada tableta contiene:
Praziquantel, Mebendazol, Pamoato de pirantel

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
OVISTOP 5 kg: 1 tableta por cada 5 kg.
OVISTOP 15 kg: 1 tableta por cada 15 kg.
OVISTOP 40 kg: 1 tableta por cada 40 kg.
Repetir la dosis a los 15 días.

CONTRAINDICACIONES
No administrar con compuestos piperazínicos. Suministrar a partir de los 22 días de edad.

PRESENTACIÓN
OVISTOP 5, 15 y 40 kg: Dispensador de 45, 30 y 12 blíster conteniendo 2 tabletas, respectivamente.

PREDNISOLONA JARABE

Antiinflamatorio-Antialérgico

INDICACIONES
Procesos inflamatorios. Para el tratamiento de procesos alérgicos, desórdenes musculoesqueléticos y enfermedades autoinmunes.

FÓRMULA
Cada 5mL contiene:
Prednisolona 15 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros y gatos: iniciar con 0.5 a 1 mg por kg 2 veces al día por 5 - 8 días y luego disminuir hasta la mínima dosis en días alternos.

CONTRAINDICACIONES
No usar en hembras gestantes.

PRESENTACIÓN
Frasco de 30 mL.

RANITIDINA

Antiulceroso, regulador de la acidez gástrica

INDICACIONES
Tratamiento y/o profilaxis de úlceras gástricas, duodenales, gastritis urémica, gastritis erosiva.

FÓRMULA
Cada 5 mL contiene:
Ranitidina (en forma de clorhidrato) 150 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros y gatos: de 2.2 a 4.2 mg por kg cada 12 horas equivalentes a una dosis de 0.1 mL por kg de peso 2 veces al día durante 4 días.

CONTRAINDICACIONES
Animales hipersensibles a la fórmula. Solo debe ser usada durante la preñez si es estrictamente necesario.

PRESENTACIÓN
Frasco de 60 mL

Droguería e Importadora Alemana

Lisan

SHAMPOO ALOE VERA

Shampoo Revitalizador de la piel y abrillantador del pelo

INDICACIONES
Humecta e impide la resequedad y el agrietamiento de la piel. Posee un efecto astringente, regenerante y renovador permitiendo una limpieza profunda.

FÓRMULA
Cada 100 mL contiene:
Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) 5 %

MODO DE EMPLEO
Humedecer el pelo y aplicar frotando una cantidad suficiente del shampoo, dejar actuar por 5 - 10 minutos y enjuagar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN
Frasco de 245 mL.

SHAMPOO ARCILLA VOLCÁNICA AZUFRE

Coadyuvante en el control de ácaros, hongos y bacterias

INDICACIONES
Profilaxis y tratamiento de patologías cutáneas producidas por ácaros, hongos y bacterias.

COMPOSICIÓN
Cada 100 mL contiene:
Azufre1.5 g
Arcilla volcánica 2 g

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Preventivo: humedezca el pelo de la mascota, aplicar cantidad suficiente de shampoo dejándolo por 1 - 2 minutos y retirar con suficiente agua.

Tratamiento: se aplica al pelo previamente humedecido por 5 minutos y retirar con suficiente agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN
Frasco de 245 mL

SHAMPOO AZUL DE METILENO

Abrillantador y estabilizador de la pigmentación del pelo blanco o negro

INDICACIONES
Abrillantador y estabilizador de la pigmentación del pelo. Elimina las manchas amarillentas.

COMPOSICIÓN
Cada 100 mL contiene:
Azul de metileno 0.001%

MODO DE EMPLEO
Humedecer el pelo de la mascota, aplicar una cantidad suficiente de shampoo dejándolo por 5 minutos y retirar con suficiente agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN
Frasco de 245 mL.

SHAMPOO CLORHEXIDINA

Shampoo Antiséptico y antibacteriano

INDICACIONES
Profilaxis y tratamiento de dermatitis y piodermas. Posee acción contra Staphylococcus intermedius, Malassezia pachydermatis y Mycrosporum canis.

FÓRMULA
Cada 100 mL contiene:
Gluconato de Clorhexidina 3%

MODO DE EMPLEO
Preventivo: humedezca el pelo y aplique una cantidad suficiente de shampoo dejándolo por 2 minutos y retirar con suficiente agua.

Tratamiento: humedezca el pelo y aplique el shampoo dejándolo durante 8 minutos y enjuagar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN
Frasco de 220 mL y 1 Galón

TRAMADOL

Analgésico

INDICACIONES
Para el manejo del dolor de moderado a severo, de origen agudo o crónico.

FÓRMULA
Cada mL contiene:
Tramadol Clorhidrato 100 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros y gatos: 2 - 5 mg por kg cada 6 - 8 horas.
Cada mL = 20 gotas, cada gota = 5 mg.

CONTRAINDICACIONES
No se recomienda su uso durante el periodo de gestación y lactancia, ni en animales débiles o epilépticos.

PRESENTACIÓN
Frasco conteniendo 10 mL.

TRIMETOPRIMA SULFA SUSPENSION

Antibiótico

INDICACIONES
Infecciones de vías respiratorias, tracto urinario, gastrointestinal, piel y enteritis por coccidias.

FÓRMULA
Cada 5 mL contiene:
Trimetoprima 40 mg
Sulfametoxazol 200 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros y gatos: 1 mL por cada 2 kg de peso cada 12 horas por 5 días.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en pacientes hipersensibles a las sulfonamidas.

PRESENTACIÓN
Frasco de 60 mL

TRIMETOPRIMA SULFA

Antibiótico

INDICACIONES
Infecciones de vías respiratorias, tracto urinario, gastrointestinal, piel y enteritis por coccidias.

FÓRMULA
Cada tableta contiene:
Trimetoprima 80 mg
Sulfametoxazol 400 mg

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Perros y gatos: 25 mg por kg (1 tableta por 16 kg de peso) cada 12 horas por 5 días.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la fórmula.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo 10 tabletas ranuradas de 480mg.