

Richmond
Vet Pharma™

Richmond
Vet Pharma™

RICHMOND VET PHARMA
ARGENTINA

APRAX ECTOPILLS

Antiparasitario Externo



INDICACIONES

Antiparasitario externo de administración oral para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y garrapatas en perros.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Spinosad 350 mg, 700 mg, 1400 mg y 2100 mg según presentación; Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros de 2,5 a 5 kg: ½ comprimido de 500 mg.
Perros de 5 a 10 kg: 1 comprimido de 500 mg.
Perros de 11 a 20 kg: 1 comprimido de 1000mg.
Perros de 21 a 30 kg: 1 comprimido de 2000mg.

Perros de 31 a 50 kg: 1 comprimido de 3000mg.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales menores de 14 semanas de edad, ni en gatos.

PRESENTACIÓN

Blíster de 1 comprimido de 500mg, 1000mg, 2000 mg y 3000 mg según presentación.

APRAX SUSPENSIÓN

Antiparasitario Interno de amplio espectro



INDICACIONES

Indicado para el control de las parasitosis gastrointestinales causadas por nematodos y cestodos.

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:
Fenbendazol 5 g; Praziquantel 0,5 g; Pirantel 0,5 g; Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 1 mL/kg/día. Una sola toma.

CONTRAINDICACIONES

Indicado en hembras preñadas a partir del día 40, en cachorros a los 30 días de vida y en gatos desde las 6 semanas.

PRESENTACIÓN

Gotero conteniendo 20 mL.

BUPINEX VET

Anestésico local



INDICACIONES

Anestesia y/o analgesia infiltrativa, local de tejidos y estructuras.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Bupivacaína Clorhidrato 0,50 g; Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 0,25 mg/kg de peso.
Anestesia de tejidos y estructuras (cirugías menores): 1 mL cada 4,5 kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en tejidos infectados. No usar como anestésico tópico o de superficie en mucosas.

PRESENTACIÓN

Viales conteniendo 50 mL de solución inyectable estéril.

DAZAM

Tranquilizante psicotrópico



INDICACIONES

Tranquilizante, sedante, ansiolítico, relajante muscular. Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia.

INDICACIONES

Cada 100 mL contiene:
Diazepam 0,50 g; Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: Aplicar lentamente por vía EV:
Anticonvulsivante: 0,5 a 1 mg/kg.
Inducción y mantenimiento anestésico: 0,2 – 0,40 mg/kg.

CONTRAINDICACIONES

Enfermedad hepática o renal, glaucoma, neonatos, depresión respiratoria, coma, shock, intoxicación con organofosforados.

PRESENTACIÓN

Vial conteniendo 20 mL de solución inyectable.

La calma de estar protegido

UN COMPRIMIDO MENSUAL PARA MANTENERLO PROTEGIDO · **1** TOMA POR MES

EctoPills,TM perros sin pulgas

Antiparasitario Externo | Pulguicida | Garrapaticida



De 2,5 a 10 kg



De 11 a 20 kg



De 21 a 30 kg



De 31 a 50 kg

Spinosad en comprimidos saborizados

Richmond
Vet PharmaTM

Más información en www.drogueriaalemana.com
Síguenos en @ **DrogueriaAlemanaVet**

DETOR

Agonista $\alpha 2$ Adrenérgico, Sedante, Relajante Muscular, Analgésico



INDICACIONES

Sedante, analgésico y relajante muscular. Manejo del dolor abdominal. En combinación en protocolos de anestesia y analgesia, y como medicación preanestésica.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Medetomidina clorhidrato 0,05 g Excipientes c.s.p.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Gatos: 10 mcg/kg IV lenta. 40 – 80 mcg/kg IM.
Perros: 5 a 10 mcg/kg IV lenta. 20-40 mcg/kg IM.
Aplicación intranasal: ver indicaciones adjuntas en prospecto.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales menores a 12 semanas, diabéticos, con glaucoma, en shock, en hembras gestantes.

PRESENTACIÓN

Vial conteniendo 10 mL y 50 mL de solución inyectable estéril.

DEXA 20

Antiinflamatorio Glucocorticoide



INDICACIONES

Terapéutica de emergencia de diversos estados de shock, anafilaxia, broncoespasmo, neuralgias y neuropatías, enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Alergias.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Dexametasona 21 fosfato disódico 2 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 0,1 a 2 mg/kg EV, IM o SC.
Estados de shock: 4 a 8 mg/kg EV.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en el último tercio de gestación, en glaucoma, diabetes mellitus, procesos ulcerativos, tuberculosis.

PRESENTACIÓN

Vial conteniendo 20 mL de solución inyectable estéril.

GASTRINE INJECTION

Antiácido, antiemético y proquinético gastrointestinal



INDICACIONES

Vómitos asociados con trastornos eméticos. Quimioterapia oncológica, reflujo gastrointestinal. Úlceras o neoplasia gástrica. Dilatación gástrica. Motilidad gástrica anormal.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Ranitidina: 2 g; Metoclopramida: 0,5 g
Excipientes c.s.p.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 0,5 a 1 mL cada 10 kg de peso IM, SC o EV

CONTRAINDICACIONES

Hemorragia gastrointestinal, obstrucción o perforación y en pacientes hipersensibles. Se contraindica en pacientes con desórdenes convulsivos.

PRESENTACIÓN

Vial conteniendo 50 mL de solución inyectable estéril.

HEPATONE

Protector y estimulante de la función hepática



INDICACIONES

Protege y estimula la actividad hepática. Disfunciones hepáticas como hepatitis, insuficiencia hepática, intoxicaciones por plomo, mercurio, arsénico. Intoxicaciones alimentarias. Cetosis.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Sorbitol 21 g, D-L Metionina 1.5 g, Tiamina HCl 0.30 g,
Ácido Tióctico 0.20 g, Excipientes c.s.p.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y Gatos: 1 mL cada 10 kg de peso EV o IM, cada 24 hrs.

CONTRAINDICACIONES

No presenta.

PRESENTACIÓN

Vial conteniendo 50 mL, 100 mL, 250 mL de solución inyectable estéril.

INELTANO

Anestésico general inhalatorio



INDICACIONES

Anestésico general de uso por vía inhalatoria.

FÓRMULA

Isoflurano 100%

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Inducción: 2 – 5 %. Mantenimiento: 1,5 – 1,8%. Su administración se podrá realizar previa intubación endotraqueal del paciente por medio de una máscara facial o cámara de inducción.

CONTRAINDICACIONES

No usar en pacientes con historia de hipertermia maligna. Usar con precaución en pacientes con falla hepática severa, arritmias cardíacas, miastenia gravis. Raramente puede producir hipotensión, depresión cardíaca o disritmias.

PRESENTACIÓN

Vial conteniendo 100 mL.

LIDOCAÍNA

Agente anestésico local y antiarrítmico



INDICACIONES

Anestesia infiltrativa de todo tipo.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Lidocaína, clorhidrato: 2 g.
Excipientes c.s.p.: 100 ml.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Anestesia regional o local: 3 mg/kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en tejidos infectados o con hematoma. Precaución en aquellos pacientes con enfermedad hepática, falla cardíaca congestiva, shock, depresión respiratoria

PRESENTACIÓN

Viales por 100 mL de solución inyectable estéril.

IONOMAX THERAPY

Solución hidroelectrolítica balanceada



INDICACIONES

Reposición de fluidos y electrolitos. Mantenimiento del volumen y alcalinización del plasma.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Gluconato de sodio, Acetato de sodio, Cloruro de sodio,
Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio, Dextrosa.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y Gatos: 50-70 mL/kg/día.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en hemólisis severa, oliguria, cetoacidosis diabética, diabetes insípida, intoxicación con sal.

PRESENTACIÓN

Bolsa colapsable por 1 L.

YOHIMBINE

Antagonista específico de los receptores alfa 2 adrenérgicos



INDICACIONES

Reversor específico de los efectos de la Xilacina y Medetomidina.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Yohimbina Clorhidrato 0,2 g.
Excipientes csp.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 0,1 mg/Kg EV.
Gatos: 0,5 mg/Kg EV.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo. Enfermedad renal, desordenes convulsivos. Riesgo en situaciones de preñez.

PRESENTACIÓN

Viales por 10 mL. Solución inyectable estéril.

ALGEN COMPRIMIDOS

Analgésico somático y visceral



INDICACIONES

Control del dolor somático y/o visceral de grado moderado a severo y de origen agudo o crónico (fracturas, luxaciones, contusiones, osteoartritis, neuropatías, etc.). Dolor postquirúrgico.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene, según presentación:
Tramadol Clorhidrato 20 mg y 60 mg; Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 1 a 4 mg/kg. Cada 6 a 8 horas.
Gatos: 2 a 4 mg/kg. Cada 6 a 8 horas.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en pacientes con Insuficiencia hepática o renal severa. No utilizar en hembras preñadas, lactantes.

PRESENTACIÓN

Algen 20 y 60 mg: 12 blísteres conteniendo 10 comprimidos ranurados en 2 partes iguales c/u.

ALGEN LD

Analgésico somático y visceral



INDICACIONES

Control del dolor somático y/o visceral de grado moderado a severo y de origen agudo o crónico.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Tramadol Clorhidrato 6000 mg;
Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 1-2 mg/kg SC, IM, EV lenta, cada 6 a 8 horas.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en pacientes con insuficiencia hepática severa, falla renal, hembras preñadas, lactantes ni por infusión EV rápida o en bolo.

PRESENTACIÓN

Vial por 50 mL de solución inyectable estéril.

KETONAL 100

Anestésico general disociativo



INDICACIONES

Anestesias generales. Agente anestésico único o combinado. Inmovilización del paciente.

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:
Ketamina Clorhidrato 11, 52 g;
Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: de 11 a 22 mg/kg vía IM.
Gatos: de 11 a 33 mg/kg vía IM.

CONTRAINDICACIONES

Animales con insuficiencia hepática o renal. Riesgo en pacientes con falla cardíaca y aneurismas arteriales.

PRESENTACIÓN

Viales conteniendo 50 mL de solución inyectable estéril.

NALBUFINE

Analgésico narcótico



INDICACIONES

Control del dolor. Medicación preanestésica. Analgesia intraoperatoria y postoperatoria.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Nalbufina, clorhidrato 1 g.
Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 0.5 a 2 mg/kg, SC, IM, IV.
Gatos: 1.5 a 3 mg/kg, IV.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con depresión respiratoria grave, con disfunción hepática o renal. Felinos asmáticos. Precaución en hembras gestantes.

PRESENTACIÓN

Vial conteniendo 20mL de solución inyectable estéril.

MIDAZOLAM

Tranquilizante, sedante y relajante muscular



INDICACIONES

Acción sedante. Ansiolítico, tranquilizante y miorelajante. Inductor de anestesia.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Midazolam 0,5 g.
Excipientes c.s.p.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 0.1 – 0.2 mg/kg, cada 2 a 6 horas, vía IM o IV.
Gatos: 0.1 – 0.2 mg/kg, cada 2 a 6 horas, vía IM o IV

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al fármaco, insuficiencia hepática o renal severa, hembras gestantes y en pacientes debilitados o gerontes.

PRESENTACIÓN

Vial conteniendo 20 mL de solución inyectable estéril.

PROPOVET

Anestésico de acción rápida



INDICACIONES

Agente anestésico de corta duración para procedimientos menores.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Propofol: 1,0 g.
Excipientes c.s.p.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 5 – 7.5 mg/kg
Gatos: 5 – 8 mg/kg

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al fármaco. Produce depresión cardio-respiratoria. Riesgo durante la preñez.

PRESENTACIÓN

Vial conteniendo 20 mL de solución inyectable estéril.

XILACINA 20mg

Sedante, miorelajante y analgésico no narcótico



INDICACIONES

Agente preanestésico. Procedimientos quirúrgicos, examen semiológico en boca, orejas, radiografías.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Xilacina, clorhidrato 2 g
Excipientes c.s.p.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 0.25 a 0.55 mL cada 10 kg de peso EV, 0.5 a 0.1 mL cada 10 kg de peso IM.
Gatos: 0.12 a 0.25 mL cada 5 kg de peso EV, 0.25 a 0.5 mL

cada 5 kg de peso IM.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales que reciban epinefrina o que tengan arritmias ventriculares. No usar en gestación.

PRESENTACIÓN

Vial conteniendo 20 mL de solución inyectable estéril.

XILACINA 100mg

Sedante, miorelajante y analgésico no narcótico



INDICACIONES

Agente preanestésico. Procedimientos quirúrgicos, examen semiológico en boca, orejas, radiografías.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Xilacina, clorhidrato 10 g
Excipientes c.s.p.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 0.05 a 0.1 mL cada 10 kg de peso EV, 0.1 a 0.22 mL cada 10 kg de peso IM.
Gatos: 0.025 a 0.05 mL cada 5 kg de peso EV, 0.05 a 0.1

mL cada 5 kg de peso IM.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales que reciban epinefrina o que tengan arritmias ventriculares. No usar en gestación.

PRESENTACIÓN

Vial conteniendo 50 mL de solución inyectable estéril.

DERMAPET PELO LARGO

Shampoo para pelo largo,
liso y ondulado



INDICACIONES

Shampoo con poder de dispersión de la grasa y suciedad. Reparador de la fibra capilar.

COMPOSICIÓN

Ceramidas, alantoína, betaína de coco.

MODO DE EMPLEO

Uso Externo. Mojar el pelaje, aplicar el producto y dejar actuar 5 minutos, enjuagar con abundante agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la ingestión, la inhalación y el contacto con las mucosas.

PRESENTACIÓN

Bidón por 5 L / 1 L
Pomo por 250 mL

DERMAPET VOLUMINIZANTE

Shampoo para mantos
de volumen



INDICACIONES

Limpieza profunda, desenreda, da brillo y suavidad. Ideal para uso en mantos que requieran volumen.

COMPOSICIÓN

Alantoína, betaína de coco, complejo voluminizante, aroma sweet clean.

MODO DE EMPLEO

Uso Externo. Mojar el pelaje, aplicar el producto y dejar actuar 5 minutos, enjuagar con abundante agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la ingestión, la inhalación y el contacto con las mucosas.

PRESENTACIÓN

Bidón por 5 L / 1 L
Pomo por 250 mL

DERMAPET ALL FIT TEXTURIZER

Shampoo para todo tipo de pelo



INDICACIONES

Shampoo para la higiene diaria. Todo tipo de mantos: cortos, semi-largos, lacio y ondulados.

COMPOSICIÓN

Ceramidas, alquilolamida de coco, aceite de Jojoba. Aroma manzana.

MODO DE EMPLEO

Uso Externo. Mojar el pelaje, aplicar el producto y dejar actuar 5 minutos, enjuagar con abundante agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la ingestión, la inhalación y el contacto con las mucosas.

PRESENTACIÓN

Bidón por 5 L / 1 L
Pomo por 250 mL

DERMAPET HAIR STYLING CONDITIONER

Acondicionador



INDICACIONES

Indicado en todo tipo de mantos. Mantiene la piel y el manto hidratados.

COMPOSICIÓN

Ceramidas, Provitamina B5.

MODO DE EMPLEO

Uso Externo. Animales de manto lacio y de pelo largo aplicarlo puro sobre las puntas, o en el total del manto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la ingestión, la inhalación y el contacto con las mucosas.

PRESENTACIÓN

Bidón por 5 L / 1 L
Pomo por 250 mL

DERMAPET INTENSIVE WASH

Shampoo prelavado
intenso neutralizador de olores



INDICACIONES

Shampoo de prelavado para la higiene diaria de perros y gatos. Indicado en casos de mucha suciedad. Para todo tipo de pelos.

COMPOSICIÓN

Urea, Neutralizador de olor, glicerina, aroma neutral base.

MODO DE EMPLEO

Uso Externo. Mojar el pelaje, aplicar el producto y dejar actuar 5 minutos, enjuagar con abundante agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la ingestión, la inhalación y el contacto con las mucosas.

PRESENTACIÓN

Bidones por 5 L.

DERMAPET FRAGRANCE PUPPY COTTON

Perfume para cachorros de agradable
y duradera intensidad



INDICACIONES

Perfume de fragancia intensa y persistencia para perros cachorros.

COMPOSICIÓN

Alcohol de cereal, Propilenglicol, Esencia Purple Gem.

MODO DE EMPLEO

Uso Externo. Rociar sobre la superficie del manto del animal en la cantidad deseada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la ingestión, la inhalación y el contacto con las mucosas.

PRESENTACIÓN

125 mL.

DERMAPET FRAGRANCE FEMALE

Perfume de suave y
delicado aroma para hembras



INDICACIONES

Perfume de fragancia intensa y persistencia para perros hembras.

COMPOSICIÓN

Alcohol de cereal, Propilenglicol, Esencia Penny.

MODO DE EMPLEO

Uso Externo. Rociar sobre la superficie del manto del animal en la cantidad deseada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la ingestión, la inhalación y el contacto con las mucosas.

PRESENTACIÓN

125 mL.

DERMAPET FRAGRANCE ATTITUDE

Perfume de presencia intensa y
persistente para perros machos



INDICACIONES

Perfume de fragancia intensa y persistencia para perros machos.

COMPOSICIÓN

Alcohol de cereal, Propilenglicol, Esencia Plus Pre.

MODO DE EMPLEO

Uso Externo. Rociar sobre la superficie del manto del animal en la cantidad deseada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la ingestión, la inhalación y el contacto con las mucosas.

PRESENTACIÓN

125 mL.



DERMAPET
PROFESSIONAL GROOM

**UN NUEVO CONCEPTO EN
DERMOCOSMÉTICA ANIMAL**

- ☑ *Recupera y exalta la belleza de piel, pelo y manto*
- ☑ *Notable poder de dispersión de la grasa y suciedad*

